


La funció de reproducció


1.- Escriu el nom de les parts d l'aparell reproductor masculí.



2.- Relaciona:

Testicles	Òrgan extern musculós
Uretra	Comuniquen els testicles amb la uretra
Penis	Glàndules que junt amb la pròstata produeixen un líquid que conté els espermatozoides
Conductes deferents	Produeixen les cèl·lules sexuals masculines
Vesícules seminals	Expulsa a l'exterior l'orina i el semen

3.- Escribe el nombre de las partes de l'aparell reproductor femení.



4.- Relaciona:

vagina	Òrgan extern format per replers que protegeix l'entrada a la vagina
ovaris	Comuniquen cadascun dels ovaris amb l'úter
úter	Òrgan on es produeixen les cèl·lules sexuals femenines.
vulva	Conducte musculós que uneix l'úter amb l'exterior
Trompes de Fal·lopi	Òrgan buit i musculós que conté l'embrió durant l'embaràs

5.- Completa:

Les cèl·lules sexuals masculines s'anomenen i
les femenines .

6.- Relaciona les següents parts segons a qui pertanyen.

vagina		
penis		
úter	•	femení
ovaris	•	
testicles	•	masculí
pròstata	•	
vulva		

7.- Indica a qui pertanyen els següents caràcters sexuals secundaris.

Es desenvolupen les mames

La veu es torna més greu

Neix pèl a les aixelles i al pubis

S'eixamplen els malucs

Apareix borriçol a la cara i tòrax

8.- Completa:

Quan les dones arriben a la maduresa , comencen a

: aproximadament cada dies, un

madur es desprèn d'un dels ovaris i va cap a l' .

Si no és , sortirà a l'exterior amb petites restes de pell de

l'úter i . Aquest procés es coneix com a

o .

A certa edat, entre el 50 o 60 anys els ovaris deixen de produir òvuls.

Aquest procés s'anomena i per tant desapareix la regla.

9.- Completa:

La consisteix en la unió d'un


de la dona amb un de l'home.

L'òvul fecundat o es comença a dividir mentre avança cap a l' , impulsat per les trompes de Fal·lopi.

Un cop a l'úter, el zigot s'adhereix a les seves parets i comença l'

o .

10.- Escriu el nom corresponent del procés de fecundació.



11.- Relaciona:

Bessons fraters

Un zigot es divideix en dos

Bessons idèntics

Dos òvuls són fecundats per dos espermatozoides

12. Relaciona:

Placenta

Conducte per proporcionar nutrients i oxigen

Sac amniòtic

Bossa que protegeix el fetus

Cordó umbilical

Bossa que conté el fetus i s'uneix a la mare

13.- Completa:

Les fases del part són: la

, l'

I el

.

14.- Relaciona:

deslliurament

Tenen lloc les contraccions de l'úter

dilatació

Expulsió del cordó umbilical, la placenta i el sac amniòtic

expulsió

El fetus surt a l'exterior

14.- Relaciona:

càncer

Malaltia de transmissió sexual

sida

Impossibilitat de concebre fills de manera natural

esterilitat

Reproducció anòmala de les cèl·lules

vaginitis i uretritis

Redueix les defenses de l'organisme

sífilis

Infecció provocada per bacteris