



CLICK THE CORRECT "OPTION" FOR EACH QUESTION, AND CLICK THE "FINISH " BUTTON AT THE END OF THE TEST ,TO KNOW YOUR SCORE.



Multiple choice questions



1. If $n(A \times B) = 6$ and $A = \{1,3\}$ then $n(B)$ is
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6
2. $A = \{a, b, p\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{p, q, r, s\}$ then $n[(A \cup C) \times B]$ is
 (A) 8 (B) 20 (C) 12 (D) 16
3. If $A = \{1,2\}$, $B = \{1,2,3,4\}$, $C = \{5,6\}$ and $D = \{5, 6, 7, 8\}$ then state which of the following statement is true.
 (A) $(A \times C) \subset (B \times D)$ (B) $(B \times D) \subset (A \times C)$
 (C) $(A \times B) \subset (A \times D)$ (D) $(D \times A) \subset (B \times A)$
4. If there are 1024 relations from a set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ to a set B , then the number of elements in B is
 (A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 8
5. The range of the relation $R = \{(x, x^2) \mid x \text{ is a prime number less than } 13\}$ is
 (A) $\{2,3,5,7\}$ (B) $\{2,3,5,7,11\}$
 (C) $\{4,9,25,49,121\}$ (D) $\{1,4,9,25,49,121\}$
6. If the ordered pairs $(a + 2, 4)$ and $(5, 2a + b)$ are equal then (a, b) is
 (A) $(2, -2)$ (B) $(5, 1)$ (C) $(2, 3)$ (D) $(3, -2)$
7. Let $n(A) = m$ and $n(B) = n$ then the total number of non-empty relations that can be defined from A to B is
 (A) m^n (B) n^m (C) $2^{mn} - 1$ (D) 2^{mn}
8. If $\{(a, 8), (6, b)\}$ represents an identity function, then the value of a and b are respectively
 (A) $(8, 6)$ (B) $(8, 8)$ (C) $(6, 8)$ (D) $(6, 6)$

9. Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $B = \{4, 8, 9, 10\}$. A function $f : A \rightarrow B$ given by $f = \{(1, 4), (2, 8), (3, 9), (4, 10)\}$ is a
- (A) Many-one function (B) Identity function
(C) One-to-one function (D) Into function
10. If $f(x) = 2x^2$ and $g(x) = \frac{1}{3x}$, then $f \circ g$ is
- (A) $\frac{3}{2x^2}$ (B) $\frac{2}{3x^2}$ (C) $\frac{2}{9x^2}$ (D) $\frac{1}{6x^2}$
11. If $f : A \rightarrow B$ is a bijective function and if $n(B) = 7$, then $n(A)$ is equal to
- (A) 7 (B) 49 (C) 1 (D) 14
12. Let f and g be two functions given by
- $f = \{(0, 1), (2, 0), (3, -4), (4, 2), (5, 7)\}$
 $g = \{(0, 2), (1, 0), (2, 4), (-4, 2), (7, 0)\}$ then the range of $f \circ g$ is
- (A) $\{0, 2, 3, 4, 5\}$ (B) $\{-4, 1, 0, 2, 7\}$ (C) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (D) $\{0, 1, 2\}$

13. Let $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$ then
- (A) $f(xy) = f(x) \cdot f(y)$ (B) $f(xy) \geq f(x) \cdot f(y)$
(C) $f(xy) \leq f(x) \cdot f(y)$ (D) None of these
14. If $g = \{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$ is a function given by $g(x) = \alpha x + \beta$ then the values of α and β are
- (A) $(-1, 2)$ (B) $(2, -1)$ (C) $(-1, -2)$ (D) $(1, 2)$
15. $f(x) = (x + 1)^3 - (x - 1)^3$ represents a function which is
- (A) linear (B) cubic (C) reciprocal (D) quadratic

CLICK THE CORRECT "OPTION" FOR EACH QUESTION, AND CLICK THE "FINISH" BUTTON AT THE END OF THE TEST, TO KNOW YOUR SCORE.

விடைகளை எழுதிய பின் "FINISH" பொத்தானை அழுத்தி மதிப்பெண்ணை தெரிந்து கொள்ளவும் ..முழு மதிப்பெண் பெறும் வரை ,மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யவும்