



1. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า



Example $7 \times 5 = n$ $n = 35$	1) $M \times 7 = 70$ $M = \dots\dots\dots$	2) $8 \times R = 64$ $R = \dots\dots\dots$
3) $3 \times 24 = S$ $S = \dots\dots\dots$	4) $K \times 10 = 10$ $K = \dots\dots\dots$	5) $96 \div C = 8$ $C = \dots\dots\dots$
6) $45 \div a = 1$ $a = \dots\dots\dots$	7) $56 \div 8 = m$ $m = \dots\dots\dots$	8) $g \div 9 = 12$ $g = \dots\dots\dots$

2. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า จากกลุ่มของประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้

Example $7 \times 5 = n$, แสดงว่า $n = 35$ $5 \times x = 35$, แสดงว่า $x = 7$ $35 \div c = 7$, แสดงว่า $c = 5$ $35 \div x = 5$, แสดงว่า $x = 7$	1) $8 \times 6 = a$, $a = \dots\dots\dots$ $6 \times b = 48$, $b = \dots\dots\dots$ $48 \div 6 = b$, $b = \dots\dots\dots$ $a \div 8 = 6$, $a = \dots\dots\dots$
2) $11 \times 12 = s$, $s = \dots\dots\dots$ $t \times 11 = 132$, $t = \dots\dots\dots$ $s \div 11 = 12$, $s = \dots\dots\dots$ $132 \div t = 11$, $t = \dots\dots\dots$	3) $9 \times 3 = k$, $k = \dots\dots\dots$ $r \times 9 = 27$, $r = \dots\dots\dots$ $27 \div 3 = w$, $w = \dots\dots\dots$ $k \div 9 = 3$, $k = \dots\dots\dots$

