

## IST's: Infecções Sexualmente Transmissíveis

Durante a aula estudamos infecções cujos agentes causadores (vírus, bactérias e outros organismos) são transmitidos principalmente por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) com pessoas infectadas. Nas relações sexuais podem ser prevenidas por meio do uso de preservativos. A seguir, identifique-as preenchendo o retângulo com a IST correspondente:

1. Esse conjunto de diversos tipos de vírus infectam as mucosas do trato genital e pele.

2. É causada por uma bactéria e o sintoma inicial comum é uma ferida no local de entrada da bactéria (vagina, boca, , pênis, etc.). Em estadoo avançadp surgem lesões na pele, ossos, sistema cardiovascular e nervoso que pode levar a morte!

4. Essa IST é causada por um vírus que provoca o aparecimento de bolhas agrupadas na região do pênis, vagina, ânus ou colo do útero e podem se tornar dolorosas, causando coceira, irritação local, dores ao urinar e febre

7. Causada pelo vírus da imodeficiência humana, que ataca as células do sistema imune, especialmente os glóbulos brancos, por isso, infectados podem apresentar imunidade baixa.

9. Essas bactérias não apresentam sintomas na maioria das mulheres, mas pode apresentar corrimento ou dor durante relações sexuais. Já em homens, apresentam dor ao urinar, dores nos testículos, corrimento amarelado ou de cor clara.

Nome \_\_\_\_\_

Professor \_\_\_\_\_

Série & Turma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_