

วง ○ รอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

(ข้อ ๑-๕ ประเมินตัวชี้วัด พ ๕.๑ ข้อ ๒)

๑. การใช้ยาชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเกิดผลเสียอย่างไร
 - ก. เชื้อโรคดื้อยา
 - ข. มีอาการติดยา
 - ค. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
 - ง. ยาเสื่อมคุณภาพเร็ว
๒. ข้อใดคือลักษณะของการแพ้ยา
 - ก. กินอาหารได้น้อย
 - ข. เหงื่อออกมาก
 - ค. ผดผื่นคัน
 - ง. ปากบวม
๓. หลังใช้ยาแล้ว มีอาการผื่นคันที่ผิวหนัง ควรทำอย่างไร
 - ก. หยุดใช้ยาทันที
 - ข. ลดปริมาณยาในครั้งต่อไป
 - ค. เพิ่มปริมาณยาเป็น ๒ เท่า
 - ง. ลองใช้ยาอีกครั้งเพื่อดูผลการใช้
๔. เมื่อกินยาแก้แพ้แล้ว ไม่ควรขับรถ เพราะอะไร
 - ก. จะทำให้ตื่นเต้น
 - ข. จะทำให้ง่วงนอน
 - ค. จะทำให้อยากกินอาหาร
 - ง. จะทำให้มองไม่เห็นทาง
๕. การใช้ยานอนหลับติดต่อกันเป็นเวลานานๆ มีผลเสียอย่างไร
 - ก. ง่วงนอนมาก
 - ข. ติดยา
 - ค. หน้าบวม
 - ง. เกิดผดผื่นคัน

(ข้อ ๖-๑๐ ประเมินตัวชี้วัด พ ๕.๑ ข้อ ๓)

๖. ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด
 - ก. ใช้ยาตามวิธีที่เขียนไว้บนฉลากยา
 - ข. ใช้ยาตามที่แม่เคยบอกไว้
 - ค. ใช้ยาตามที่เคยกิน
 - ง. ใช้ยาเมื่อจำเป็น
๗. ถ้าฉลากยาหลุดหายไป ควรทำอย่างไร
 - ก. ถ้ายายังไม่หมดอายุก็เก็บไว้ใช้ได้
 - ข. นำยาไปเก็บในตู้ยา
 - ค. หาฉลากใหม่มาติด
 - ง. นำยาไปทิ้ง
๘. เราไม่ควรหยิบยาที่มีลักษณะใดมาใช้
 - ก. ยาที่มีฉลากสีแดง
 - ข. ยาหยอดตาที่เปิดไว้ ๑ วัน
 - ค. ยาแคปซูลที่เม็ดไม่โป่งพอง
 - ง. ยาเม็ดที่อยู่ในขวดมีฉลากระบุ
๙. สิ่งที่เราควรทำก่อนกินยาคือข้อใด
 - ก. ชิมรสชาติ
 - ข. เตรียมน้ำดื่ม
 - ค. เขย่าขวดดูสียา
 - ง. อ่านฉลากข้างขวด
๑๐. ใครใช้ยาไม่ถูกวิธี
 - ก. โต้งกินยาหลังอาหารครึ่งชั่วโมง
 - ข. เดือนทาแอลกอฮอล์รอบแผล
 - ค. มดกินยาแก้ปวด ๓ เม็ด
 - ง. จอยดมแอมโมเนียหอม