



٦	إحداثي منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين : (٣، ١) ، (٥، ١)	أ	(٤، ١)	ب	(٨، ٢)	ج	(٨، ١)	د	(٤، ٢)
٧	عدد الطرق التي يمكن أن يرتب أحمد زيارته لـ ستة متاجر في طريق عودته الى بيته من العمل =	أ	٧٢٠	ب	٦٢	ج	٨٢٠	د	٨٢
٨	عدد الحلول للمعادلة التربيعية $x^2 - 5x + 6 = 0$	أ	حلان	ب	حل واحد	ج	لا يوجد حل	د	عدد لا نهائي من الحلول
٩	من أساليب جمع البيانات :	أ	التجربة	ب	العينة المتحيزة	ج	العينة الغير متحيزة	د	عينة عشوائية
١٠	التمثيل البياني التالي للدالة : $y = 2x^2 - 3x + 1$	أ	مفتوح الى أعلى وله قيمة عظمى	ب	مفتوح الى أعلى وله قيمة صغرى	ج	مفتوح الى أسفل وله قيمة عظمى	د	مفتوح الى أسفل وله قيمة صغرى
١١	نوع العينة في (نقحص قطعة من خيط إنتاج كل ١٠ دقائق أو نقحص قطعة من كل ٥٠ قطعة) :	أ	عينة متحيزة	ب	عشوائية بسيطة	ج	عشوائية منتظمة	د	عشوائية طبقية
١٢	أي المقاييس نستخدم لوصف بيانات عندما لا يوجد قيم متطرفة في مجموعة البيانات :	أ	الوسيط	ب	المتوسط الحسابي	ج	المتوال	د	المدى
١٣	بسطي العبارة $2x^2 - 3x + 1 = 0$	أ	$2x^2 - 3x + 1$	ب	$2x^2 - 3x + 1$	ج	$2x^2 - 3x + 1$	د	$2x^2 - 3x + 1$
١٤	إذا كان مجموع القيم المطلقة للفرق بين كل قيمة من ٥ بيانات والمتوسط الحسابي = ١٦،٤ فإن الانحراف المتوسط للبيانات =	أ	٥،٢٨	ب	٣،٢٨	ج	٦،٤	د	