

Praktiskais darbs "Dzīvnieku maņas"

Sameklē lasām grāmatā informāciju un ieliec to tukšās vietās.

Lpp.166



Dažiem dzīvniekiem ir "dzīvle kompasi" – receptorās šūnas, kas satur vielu [] un spēj uztvert [] lauku. Piemēram, medus bites, atgriezušās stropā, ar īpašu [] norāda pārējām bitēm ziedošu augu atrašanās virzienu. Bitēm [] posmos ir šūnu joslas, kas palīdz [] Zemes magnētiskajā laukā. Magnetīta veidojumi ir atrasti arī daudzu [] galvās. Izcilākie orientieristi ir **pasta** []

Lpp.169



Vežveidīgajiem, piemēram, **krabjiem**, tāpat kā kukaiņiem ir [] **acis**. Krabjiem [] acis ir salīdzinoši mazākas, taču tās novietotas uz kustīgiem [] kas dod iespēju acis [] lai paplašinātu []

Lpp.172



[] un [] orientējas ar eholokācijas palīdzību. Viņi raida [] signālus un uztver, kā tie [] no dažādiem objektiem. Pēc tā, cik ilgā laikā un kā tiek saņemta [], viņi uzzina, kur atrodas [] vai šķērslis.

Lpp.174



[], piemēram, **zalktim**, [] nav lielas nozīmes, toties viņiem ir ļoti labi attīstīta [] Vairums ķirzaku un čūsku apkārtni "izostā", ar [] uztverot apkārtējā gaisā esošās smaržvielu []. Zalktis, līdzīgi kā citas čūskas, var izbāzt mēli caur [] augšlūpā, neatverot muti.