



Q.F.B. Celina Flores Pérez

Submódulo: IDENTIFICA MICROORGANISMOS EN BASE A TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS
Tema: *A. lumbricoides* y *E. vermicularis*
Ejercicio de autoevaluación

Nombre completo _____ Semestre y grupo: _____

Instrucciones: Relaciona las siguientes columnas escribiendo dentro del paréntesis el número correspondiente.

() Tiempo que transcurre desde la ingesta del huevo de <i>A. lumbricoides</i> hasta que alcanza la etapa adulta en el hospedador.	1. Huevo infértil de <i>Ascaris lumbricoides</i>
() Estadio evolutivo intectante de <i>Ascaris lumbricoides</i> .	2. 6 horas
() Tiempo en que un huevo fértil de <i>A. lumbricoides</i> en el medio externo (tierra) y condiciones adecuadas de temperatura y humedad se convierte en un huevo embrionado (L2).	3. Ascariasis
() Cantidad de huevos que oviposita la hembra fecundada de <i>Enterobius vermicularis</i> .	4. Huevo embrionado con larva 1 (L1)
() Estadio evolutivo infectante de <i>Enterobius vermicularis</i> .	5. 3 a 4 semanas
() Estadio evolutivo de forma alargada y con una cubierta protectora formada por una capa.	6. Huevos de oxiuro
() Hábitat de <i>Enterobius vermicularis</i> .	7. <i>Ascaris lumbricoides</i>
() Estadio evolutivos de forma ligeramente ovalada o redonda y una cubierta protectora formada por tres capas.	8. oxiuriasis
() Parasitosis que produce <i>Enterobius vermicularis</i> .	9. <i>Enterobius vermicularis</i>
() Mide de 3 a 5 mm de longitud y tiene el extremo posterior curvado ventralmente con espícula al final.	10. Intestino grueso (ciego y recto)
() Cantidad de huevos que oviposita la hembra fecundada de <i>Ascaris lumbricoides</i> .	11. Macho <i>Ascaris lumbricoides</i>
() Son transparentes, pegajosos, tienen doble membrana y un lado aplanado.	12. 10000 huevos por día
() Es un geohelminto.	13. Macho <i>Enterobius vermicularis</i>
() Tiempo en que son embrionados los huevos de <i>Enterobius vermicularis</i> .	14. 1 A 2 años
() Parasitosis que produce <i>Ascaris lumbricoides</i> .	15. Huevos embrionados con larva 2 (L2)
() Tiempo de vida media de <i>Ascaris lumbricoides</i> adulto en el intestino.	16. Dos meses aproximadamente
() Proviene de hembras no fecundadas.	17. Intestino delgado
() Es el hábitat de <i>Ascaris lumbricoides</i> adulto.	18. Huevo fértil de <i>Ascaris lumbricoides</i>
	19. 200000 huevos por día

