

3. Latvijā mīt 13 abinieku sugas – 5 varžu, 6 krupju un 2 tritonu sugas.

Izlasi aprakstus par Latvijas abiniekiem un nosaki, kurš abinieks katrā no tiem raksturots!

- A. Šo abinieku tēviņiem riesta laikā uz muguras izveidojas gara sekste. Viņi Latvijā ir sastopami retāk nekā otra radniecīgā suga.
- B. Šie bezastainie abinieki dzīvo galvenokārt uz sauszemes. Meklējot patvērumu, viņi mēdz ierakties dziļi augsnē, tāpēc dzīvo vietās, kur ir smilšaina augsne.
- C. Šie brūnganie bezastainie abinieki bieži vien ir sastopami pļavās un dārzos. Viņus var pazīt pēc tumšajām “brillēm” ap acīm.
- D. Šos zaļos abiniekus ir grūti atšķirt no citām radniecīgām sugām, jo viņi nav pastāvīga suga, bet rodas divu citu sugu krustošanās rezultātā.
- E. Šīs sugas vārdes ir ļoti līdzīgas parastajai vardei. Visvieglāk var atšķirt šīs sugas tēviņus, kuri riesta laikā maina krāsu.
- G. Šis bezastainais abinieks bieži vien ir sastopams cilvēka mājokļu tuvumā. Viņa brūngani pelēcīgo ādu klāj nelieli indes dziedzeri.
- H. Šie abinieki Latvijā ir sastopami tikai dažās vietās. Viņi ir vienīgie abinieki Latvijā, kuri var kāpelēt pa kokiem.

*Parastā varde
Lielais tritons
Smilšu krupis
Purva varde
Parastais krupis
Eiropas kokuvarde
Zaļā varde*