

GLUCID

Phân loại: Mono; Poly
- Poly: Polysaccharid có thường: β-saccarose; α-maltose
- Poly: Không có đường: glycogen; TINH BỘT: α-glucose, amilose, amilopectin; CELLULOSE: β-glucose

GLUCOSE





Ứng dụng:
- Trong hoa quả, trong máu
- Thuốc trợ lực,
- Pha: huyết thanh; dd truyền


ACID CARBOXYLIC

Danh pháp:
- acid formic
- acid methanoic.



acid benzoic
acid benzen carboxylic

TCHH:
- TÍNH ACID: R-COOH ↳ càng hút e thì tính acid càng tăng
- PỨ TẠO ESTER
- P/ứ nhiệt phân acid oli carboxylic.



anhydrid succinic.

ỨNG DỤNG:
- (E300) vit C, acid ascorbic
- acid malic (trong táo)
- acid tartric (trong nho)
- acid citric (trong chanh)

acid acetic.
(E260) (giấm ăn)
↓
dung môi
Tẩy hợp thuốc
chất thơm
phẩm nhuộm

acid béo

acid benzoic.
(E210)
kích thích, niêm mạc, ợ cay họ

acid oxalic,
(khế, me, cải bó xôi, cà rốt)
Trong cơ thể: sỏi calci

acid succinic

acid fumaric (E297).
Nhiều trong nấm, rêu; ít trong TB động vật

sát trùng
↳ bệnh ngoài da, P. phẩn

Tăng / Tăng giảm → chậm chuyển hoá carb

LIVEWORKSHEETS

ESTER

ỨNG DỤNG
- D.E.P (diethyl phthalat) → chữa GHẺ
- METHYL SALICYLAT → xoa ngoài da, giảm đau cơ

HYDROXY ACID


OH
COOH

MỘT SỐ TÍNH CHẤT
- TÍNH ACID > RCOOH
  R(OH)x(COOH)
- Dẫy dãy mạch
  - Gãy đầu mạch → ALDEHY
  - Gãy giữa mạch → CETON
  α Hydroxyacid
- TẠO PHỨC Fe^{3+} : phenol < lactic < salicylic < oxalic
  tím nhạt | vàng | tím thẫm | vàng
- ESTE HOÁ NỘI PHÂN TỬ → TẠO VÒNG


ỨNG DỤNG

LACTIC
C - C - COOH
OH
- PHÂN HUỶ GLYCOGEN → L(+): TÍCH TRONG CƠ → MỎI, ĐAU
- LÊN MEN
  - Bacillus acidi laevolactici → D(-)
  - Racemic: CHỮA TIÊU CHẢY KIDS
    Bacillus lactic acidi
    Bacillus delbrucki

SALICYLIC



- NATRI SALICYLAT : giảm đau hạ sốt
- METHYL SALICYLAT : XOA BÓP ngoài da giảm đau
- ACID ACETYLSALICYLIC - ASPIRIN: giảm đau hạ sốt



MALIC HOOC - C - C - COOH : (NHO, TÁO) → THUỐC, TIÊM, CHỮA
OH

GLYCOLIC C - COOH : (củ cải đường) → NC GIẢI KHÁT
OH

CITRIC
- GIẢI KHÁT
- GIẢI ĐỘC KIỀM
- CHỐNG ĐÔNG MÁU Δ
- LÀM TAN SỎI THẬN ...

HOOC - C - C - C - COOH
OH
COOH

LIVEWORKSHEETS