Андрійко купив у шкільному буфеті 3 цукерки по 2 грн і 4 булочки. Яка ціна однієї булочки, якщо вартість всієї покупки 42 грн?

	Ціна (грн)	Кількість (шт.)	Вартість (грн)
I	2 грн	3 шт.	? } 42 грн
II	?	4 шт.	? } 42 грн

1) · = *(грн) – вартість цукерок.*

2) – = *(грн) – вартість булочок.*

3) : = *(грн)*

Відповідь: *грн ціна однієї булочки.*

2) Андрійко купив у шкільному буфеті 3 цукерки по 2 грн і 4 булочки. Яка ціна 1 булочки, якщо хлопчик заплатив за всі булочки на 30 грн більше, ніж за всі цукерки?

	Ціна (грн)	Кількість (шт.)	Вартість (грн)
I	2 грн	3 шт.	?
II	?	4 шт.	?, на 30 грн б.

1) · = *(грн) – вартість цукерок.*

2) + = *(грн) – вартість булочок.*

3) : = *(грн)*

Відповідь: *грн ціна однієї булочки.*

3) Андрійко купив у шкільному буфеті 3 цукерки по 2 грн і 4 булочки. Яка ціна 1 булочки, якщо їх вартість у 6 разів більша, ніж вартість всіх цукерок?

	Ціна (грн)	Кількість (шт.)	Вартість (грн)
I	2 грн	3 шт.	?
II	?	4 шт.	? у 6 р.б.

1) · = *(грн) – вартість цукерок.*

2) · = *(грн) – вартість булочок.*

3) : = *(грн)*

Відповідь: *грн ціна однієї булочки.*

LIVEWORKSHEETS