


HOẠI TỬ

CÁC BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI

NHÂN



BẢO TỒN: 3 bước

B1: mất bất màu ← nhân pã ribosom kiem

B2: tăng bất màu acid ← mất các gốc carboxyl protein biến chất

B3: xoá mờ các cấu trúc ← mất UNB, KHUNG C-POKE RATION SUP

Màng

mất tính thấm chọn lọc → TRƯỜNG, VỎ

BẢO VẬT

HOẠI TỬ ĐÔNG

phế biến nhất

Đặc trưng cho: hoại tử do thiếu oxy

xảy ra ở: HỒN HẾT CẤP HUYẾT
 (ví dụ: NÃO (tắc mạch))

NHÂN

mất hoàn toàn cấu trúc

vẫn còn hình dạng do protein đông lại → ngưng các cấu trúc

MỖ

khối:
 - nhô, đặc
 - ưa eosin
 - vùng của các TB kế lân.

chỉ tồn tại [LƯU]

xem chuyển sang

HOẠI TỬ LÔNG

HOẠI TỬ LÔNG

phụ thuộc hoại

Đặc trưng cho: HTKTW

thiếu oxy cục bộ
 → chấn thương

TB chết rất nhanh

→ e sữa kíp → mô lỏng rã

NHÂN

niêm trùng HTL
 (phần viêm cấp)

bach cầu đa nhân

tiểu TB

mãn huyết → mô tan biến

Ô ÁP XE


do VK sinh mủ

phần: vách xơ mỏng

trong: chất HTL
 { bach cầu đa nhân
 mãn huyết TB

HOẠI TỬ MỖ

Gặp ở:
 - chấn thương
 - viêm tủy cấp



HOẠI TỬ BÃ ĐÀU

mềm mại như bơ đậu

Đặc trưng cho: LAO (1 dạng viêm hạt mạn tính)

TB: chết; e còn đường viêm

→ các mảnh vụn bất màu EOSIN

HOẠI THỦ

Đặc trưng: THỐI RỬA DO VK KỊ KHÍ

màu đen do lắng đọng ion SULPHIDE
 hậu quả của phản giải H₂