

ACT1. Tipus d'aïllament

1. **RELACIONA** els cartells de mesures preventives amb el **TIPUS d'AÏLLAMENT** corresponent segons el tipus de transmissió de la malaltia infecciosa.

TRANSMISSIÓ PER
CONTACTETRANSMISSIÓ PER
L'AIRE (RESPIRATÒRIA)TRANSMISSIÓ PER
GOTES

Per a totes les persones que entrin a l'habitació

Rentat de mans	Guants	Bata neta	Material clínic	Porta	Visites
De 15 segons amb sabó antisèptic. En entrar i sortir de l'habitació.	En entrar a l'habitació.	En entrar a l'habitació.	Ús exclusiu.	Tancada.	Restringides.

Per a totes les persones que entrin a l'habitació

Rentat de mans	Màscara d'alta filtració	Porta	Visites
En entrar i sortir de l'habitació.	En entrar a l'habitació.	Tancada.	Restringides.

Per a totes les persones que entrin a l'habitació

Rentat de mans	Màscara quirúrgica	Porta	Visites
En entrar i sortir de l'habitació.	En entrar a l'habitació.	Tancada.	Restringides.

2. COMPLETA els espais de les frases amb les opcions disponibles:

- a) Les mesures d'aïllament són el conjunt de [] destinats a controlar i evitar la transmissió de les malalties trencant la cadena epidemiològica en alguna de les seves [] .
- b) Les precaucions estàndard són un conjunt de mesures que s'han d'aplicar a [] els [] , sense tenir en compte els seus símptomes, és a dir, el seu [] .
- c) Els sistemes de bioseguretat constitueixen en l'aplicació de coneixements, [] per salvaguardar a persones, laboratoris, àrees hospitalàries i medi ambient de l'exposició a [] potencialment infecciosos o considerats riscos [] .
- d) Les precaucions específiques són un conjunt de mesures [] segons els tipus de pacient a què es refereixin, ja que es basen en els [] utilitzats pels diferents agents [] . Són mesures d' [] que complementen a les precaucions [] .

3. SELECCIONA a quin tipus de precaució específica correspon cadascuna de les següents situacions:

- a) Transmissió per organismes patògens que poden recórrer llargues distàncies (> d'1 metre).
[]
- b) Transmissió produïda en tocar una superfície o un objecte.
[]
- c) Transmissió per patògens a persones que es troben a 1 metre o menys del malalt.
[]
- d) Aplicació a l'habitació d'una pressió negativa monitoritzada.
[]
- e) Ús de màscares d'alta filtració per part del personal sanitari.
[]
- f) Eliminació de la bata i guants, un cop utilitzats, abans de sortir de l'habitació del pacient.
[]
- g) Ús de mascareta de tipus quirúrgic.
[]