

SUICIDIO	
TCC y TC	
TDC	
Contacto activo de apoyo y seguimiento	
Plan de Seguridad de Stanley y Brown	
Programa de intervención breve en tentativas de suicidio	
Evaluación colaborativa y manejo del suicidio	

DUELO		
Intervenciones familiares	FBP	
	CHUMS	
TF-CBT		
Programas de prevención y acompañamiento		-----
TGCTA Grief-Help GIT MGT Narrativas Musicoterapia		
Arte-terapia		
Terapia de juego		

SUICIDIO			
	Ideación	Tentativa	Consumado
Plan de Seguridad			
Contacto activo de apoyo y seguimiento			
ASSIPP			
VHS			

SUICIDIO		
	Ideación	Tentativa
IDEACIÓN	TCC y TC	
	TDC	
	CAMS	
TENTATIVA	TCC y TC	
	TDC	
	CAMS	
CONSUMADO	TCC y TC	
	TDC	
	CAMS	

IMPULSOS		
Piromanía	Tcc entorno controlado	
Cleptomanía	Sensibilización encubierta	
TEI	TCC	
Tno cto sexual compulsivo	T multicomponente residencial	
Tno de compra compulsivo	TCC grupal	

RECOMENDACIÓN
Las altas tasas de comorbilidad diagnóstica informada en todos los trastornos del control de los impulsos hacen recomendable la evaluación exhaustiva de la sintomatología presente, preferentemente con entrevista clínica estructurada.
La valoración del tratamiento en los trastornos del control de los impulsos debe adaptar, en lo posible, la gravedad de la sintomatología impulsiva a la intensidad de los formatos de intervención disponibles (intervención psicológica individual o grupal, tratamiento farmacológico, tratamiento combinado, ingreso hospitalario, etc.).
En los trastornos del control de los impulsos, especialmente en los casos graves, oriente la toma de decisiones sobre el tratamiento desde el trabajo multidisciplinar, sopesando minuciosamente potenciales beneficios del tratamiento versus potenciales efectos secundarios de forma individualizada.
Durante la toma de decisiones clínicas en los trastornos del control de los impulsos, valore exhaustivamente las implicaciones éticas tanto del tratamiento como del no tratamiento para la persona atendida, allegados y comunidad.
En personas diagnosticadas de piromanía, cuyo tratamiento se desarrolle en un entorno controlado, se recomienda el TCC en formato grupal para la reducción de las conductas incendiarias.
Se recomienda la aplicación de la TCC en personas diagnosticadas de TEI para la reducción de las conductas agresivas y la optimización de la gestión de la ira.
El TCC es una alternativa eficaz para la reducción de los síntomas de hipersexualidad y conducta sexual compulsiva en las personas diagnosticadas de TCSC.
Cuando sea posible, aplique el TCC en personas diagnosticadas de trastorno de compra compulsiva; la evidencia ha mostrado su eficacia para la reducción del número de episodios de compra, así como el tiempo y dinero dedicados a esta actividad.

Tabla 3. Recomendaciones para el tratamiento basado en la evidencia de los trastornos del control de los impulsos (Fonseca, 2019)

TRASTORNO	TRATAMIENTO
Intervenciones preventivas de la DPP	TCC (Curso mamás y bebés)
	Terapia Interpersonal (Programa ROSE)
	Psicoterapia diádica (Programa PREP)
	e-Health (Be a Mom)
Tratamientos DPP	TCC (Milgrom, 2015)
	TCC (Mommoodbooster program)
	Melows Babies
	Psicoterapia diádica
Tratamientos ansiedad	TCC (Green, 2020)
	TCC-MUMentum
	Mindfulness en línea

