

Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor și al sutelor



clasamea.eu

Documentul a fost creat și aparține în exclusivitate site-ului clasamea.eu. Poate fi utilizat în scop didactic, la școală sau acasă. Poate fi redistribuit **numai cu atribuire** (menționarea sursei - link spre clasamea.eu).

Nu poate fi folosit în scopuri comerciale, nu poate fi publicat în nume propriu, nu poate fi inclus în publicații tipărite, electronice sau on-line fără permisiunea noastră. Îl oferim cu licență Creative Commons 4.0.



1. Calculează pe caiet, așezând numerele unul sub altul.

$$235 - 128 = \quad 684 - 392 = \quad 816 - 478 =$$

2. Micșorează cu 385 diferența numerelor 951 și 176.

3. Mihai are 337 lei, iar fratele său cu 128 lei mai puțin. Au împreună suficienți bani pentru a cumpăra o bicicletă care costă 525 lei? Justifică răspunsul.



1. Calculează pe caiet, așezând numerele unul sub altul.

$$235 - 128 = \quad 684 - 392 = \quad 816 - 478 =$$

2. Micșorează cu 385 diferența numerelor 951 și 176.

3. Mihai are 337 lei, iar fratele său cu 128 lei mai puțin. Au împreună suficienți bani pentru a cumpăra o bicicletă care costă 525 lei? Justifică răspunsul.



1. Calculează pe caiet, așezând numerele unul sub altul.

$$235 - 128 = \quad 684 - 392 = \quad 816 - 478 =$$

2. Micșorează cu 385 diferența numerelor 951 și 176.

3. Mihai are 337 lei, iar fratele său cu 128 lei mai puțin. Au împreună suficienți bani pentru a cumpăra o bicicletă care costă 525 lei? Justifică răspunsul.




1. Calculează pe caiet, așezând numerele unul sub altul.

$$235 - 128 = \quad 684 - 392 = \quad 816 - 478 =$$

2. Micșorează cu 385 diferența numerelor 951 și 176.

3. Mihai are 337 lei, iar fratele său cu 128 lei mai puțin. Au împreună suficienți bani pentru a cumpăra o bicicletă care costă 525 lei? Justifică răspunsul.



1. Calculează:

$$567 - 385 = \quad 902 - 835 = \quad 720 - 286 =$$

2. Cu cât este mai mare suma numerelor 346 și 275 decât diferența lor?

3. La o bibliotecă s-au adus 543 cărți cu povești, cu 269 mai puține cărți cu poezii, iar dicționare cu 167 mai puține decât cărțile cu poezii.
Câte dicționare s-au adus la bibliotecă?




1. Calculează:

$$567 - 385 = \quad 902 - 835 = \quad 720 - 286 =$$

2. Cu cât este mai mare suma numerelor 346 și 275 decât diferența lor?

3. La o bibliotecă s-au adus 543 cărți cu povești, cu 269 mai puține cărți cu poezii, iar dicționare cu 167 mai puține decât cărțile cu poezii.
Câte dicționare s-au adus la bibliotecă?




1. Calculează:

$$567 - 385 = \quad 902 - 835 = \quad 720 - 286 =$$

2. Cu cât este mai mare suma numerelor 346 și 275 decât diferența lor?

3. La o bibliotecă s-au adus 543 cărți cu povești, cu 269 mai puține cărți cu poezii, iar dicționare cu 167 mai puține decât cărțile cu poezii.
Câte dicționare s-au adus la bibliotecă?




1. Calculează:

$$567 - 385 = \quad 902 - 835 = \quad 720 - 286 =$$

2. Cu cât este mai mare suma numerelor 346 și 275 decât diferența lor?

3. La o bibliotecă s-au adus 543 cărți cu povești, cu 269 mai puține cărți cu poezii, iar dicționare cu 167 mai puține decât cărțile cu poezii.
Câte dicționare s-au adus la bibliotecă?




1. Micșorează cu 496 numerele: 743, 585, 938.

2. Află numărul necunoscut.

$a + 567 = 864$ $421 - b = 299$ $711 + c = 803$

3. La un spectacol de teatru s-au vândut 525 de bilete pentru copii și cu 267 de bilete mai puține bilete pentru adulți. Câte locuri rămân neocupate dacă sala de spectacol are 980 de scaune?




1. Micșorează cu 496 numerele: 743, 585, 938.

2. Află numărul necunoscut.

$a + 567 = 864$ $421 - b = 299$ $711 + c = 803$

3. La un spectacol de teatru s-au vândut 525 de bilete pentru copii și cu 267 de bilete mai puține bilete pentru adulți. Câte locuri rămân neocupate dacă sala de spectacol are 980 de scaune?



1. Micșorează cu 496 numerele: 743, 585, 938.

2. Află numărul necunoscut.

$a + 567 = 864$ $421 - b = 299$ $711 + c = 803$

3. La un spectacol de teatru s-au vândut 525 de bilete pentru copii și cu 267 de bilete mai puține bilete pentru adulți. Câte locuri rămân neocupate dacă sala de spectacol are 980 de scaune?




1. Micșorează cu 496 numerele: 743, 585, 938.

2. Află numărul necunoscut.

$a + 567 = 864$ $421 - b = 299$ $711 + c = 803$

3. La un spectacol de teatru s-au vândut 525 de bilete pentru copii și cu 267 de bilete mai puține bilete pentru adulți. Câte locuri rămân neocupate dacă sala de spectacol are 980 de scaune?




1. Efectuează operațiile în ordinea în care sunt scrise:

$$731 - 286 - 355 = \qquad 673 + 149 - 477 =$$
$$820 - 756 + 594 =$$

2. Ce număr trebuie scăzut din suma numerelor 435 și 296 pentru a obține 362?

3. Cu cât este mai mică diferența numerelor 435 și 178 decât suma lor?




1. Efectuează operațiile în ordinea în care sunt scrise:

$$731 - 286 - 355 = \qquad 673 + 149 - 477 =$$
$$820 - 756 + 594 =$$

2. Ce număr trebuie scăzut din suma numerelor 435 și 296 pentru a obține 362?

3. Cu cât este mai mică diferența numerelor 435 și 178 decât suma lor?




1. Efectuează operațiile în ordinea în care sunt scrise:

$$731 - 286 - 355 = \qquad 673 + 149 - 477 =$$
$$820 - 756 + 594 =$$

2. Ce număr trebuie scăzut din suma numerelor 435 și 296 pentru a obține 362?

3. Cu cât este mai mică diferența numerelor 435 și 178 decât suma lor?



1. Efectuează operațiile în ordinea în care sunt scrise:

$$731 - 286 - 355 = \qquad 673 + 149 - 477 =$$
$$820 - 756 + 594 =$$

2. Ce număr trebuie scăzut din suma numerelor 435 și 296 pentru a obține 362?

3. Cu cât este mai mică diferența numerelor 435 și 178 decât suma lor?



1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.



1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.



1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.




1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.




1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.



1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.




1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.



1. Efectuează scăderile și verifică rezultatul prin adunare.

$300 - 57 =$ $600 - 297 =$ $900 - 768 =$

2. Din diferența numerelor 800 și 390 ia cel mai mic număr natural de trei cifre diferite.

3. Maria are o bancnotă de 200 de lei. Ea ar vrea să își cumpere o căciulă care costă 36 lei și o pereche de ghete care costă 174 lei. Îi ajung banii? Justifică răspunsul.