

Nama: Gusnelly, S.Pd, M.Si

## PERPINDAHAN KALOR

Nama	:
Kelas	:
Nomor	:

**A. Materi Pembelajaran**

Perpindahan kalor

**B. Informasi Pendukung**

Perhatikan Video berikut:

### C. Paparan Isi materi


## Perpindahan Kalor

Perpindahan Kalor yang dikenal selama ini ada 3 macam, dan kecepatan perpindahan Kalor bergantung pada Caranya berpindah dan Zat perantaranya. Cara perpindahan Kalor:

- Konduksi (hantaran)
- Konveksi (aliran)
- Radiasi (pancaran)

### 1. Perpindahan Kalor secara konduksi

Adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara (konduktor), yang umumnya berupa zat padat.



Jumlah kalor yang mengalir tiap detik pada konduktor adalah:

- Berbanding lurus dengan luas penampang ( $A$ )
- Berbanding terbalik dengan panjang penghantar ( $L$ )
- Berbanding lurus dengan kenaikan suhu ( $\Delta t$ )
- Bergantung pada koefisien konduksi termal ( $K$ )

Dirumuskan:

$$\frac{Q}{t} = k \cdot \frac{A \cdot \Delta t}{\ell}$$
$$H = k \cdot \frac{A \cdot \Delta t}{\ell}$$

Keterangan:

$\frac{Q}{t}$  = kalor yang mengalir tiap detik ( $\text{kal/s}$  atau  $\text{J/s}$ )

$A$  = luas permukaan penghantar ( $\text{m}^2$ )

$\Delta t$  = perubahan suhu ( $^\circ\text{C}$ ) =  $t_2 - t_1$

$\ell$  = panjang penghantar (m)

Bahan	Konduktifitas termal ( $\text{J.s.m.}({}^\circ\text{C})^{-2}$ )	Bahan	Konduktifitas termal ( $\text{J/s.m.}({}^\circ\text{C})^{-2}$ )
Besi/baja	46	Udara	$2,4 \times 10^{-2}$
Tembaga	$39 \times 10$	Kayu	$8 \times 10^{-2}$
Alumunium	$20 \times 10$	Kaca	$8 \times 10^{-1}$

Contoh soal :

Diketahui suhu permukaan bagian dalam dan luar sebuah kaca jendela yang memiliki Panjang 2 m dan lebar 1,5 m berturut turut  $27^\circ\text{C}$  dan  $26^\circ\text{C}$ . Jika tebal kaca tersebut 3,2 mm dan konduktivitas termal kaca sebesar  $0,8 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ , maka tentukan laju aliran kalor yang lewat jendela tersebut!

- Diketahui : a.  $d = 3,2 \text{ mm} = 3,2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$   
b.  $A = 2 \times 1,5 = 3 \text{ m}^2$   
c.  $\Delta t = 27 - 26 = 1^\circ\text{C}$   
d.  $k = 0,8 \text{ W/m}^\circ\text{C}$

Ditanyakan :  $H = \dots ?$

Jawab :

$$H = k \times A \times \frac{\Delta T}{d}$$
$$= 0,8 \times 3 \times \frac{1}{3,2 \times 10^{-3}}$$
$$= 750 \text{ J/s}$$

## 2. Perpindahan Kalor secara konveksi

Adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantara, biasanya terjadi pada zat cair dan gas.

Besarnya kalor yang mengalir tiap satuan waktu pada konveksi tergantung pada:

Ø Perbedaan suhu kedua zat cair ( $\Delta t$ )

Ø Luas permukaan zat cair ( $A$ )

Ø Koefisien konveksi ( $h$ )

Perumusannya:

$$\frac{Q}{t} = h \cdot A \cdot \Delta t$$

$$H = h \cdot A \cdot \Delta t$$

Keterangan:  $h$  = koefisien konveksi termal ( $J/S \cdot m^2 \cdot K$ )

$$A = \text{luas permukaan (m}^2\text{)}$$

Terdapat dua jenis konveksi, yaitu :

a. konveksi alamiah

Pada konveksi alamiah, pergerakan atau aliran energi kalor terjadi akibat perbedaan massa jenis. a. Konveksi alamiah, misalnya pada sistem ventilasi rumah, terjadi angin darat dan angin laut, serta aliran asap pada cerobong asap pabrik

b. konveksi paksa

Pada konveksi paksa, aliran panas dipaksa dialirkan ke tempat yang dituju dengan bantuan alat tertentu, misalnya dengan kipas angin atau blower.

Konveksi paksa, misalnya terdapat pada sistem pendingin mesin pada mobil, alat pengering rambut, dan pada reaktor nuklir pembangkit tenaga.

Contoh soal :

Udara dalam sebuah kamar menunjukkan skala  $25^\circ\text{C}$ , sedangkan suhu permukaan jendela kaca kamar tersebut  $15^\circ\text{C}$ . Jika koefisien konveksi  $7,5 \times 10^{-5} \text{ W m}^{-2} (\text{ }^\circ\text{C})^{-4}$ , maka tentukan laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas  $0,6 \text{ m}^2$ !

Diketahui: a.  $\Delta T = 25 - 15 = 10^\circ\text{C}$

b.  $A = 0,6 \text{ m}^2$

c.  $h = 7,5 \times 10^{-5} \text{ W m}^{-2} (\text{ }^\circ\text{C})^{-4}$

Ditanyakan :  $H = \dots$ ?

Jawab :

$$\begin{aligned} H &= h \times A \times \Delta T^4 \\ &= 7,5 \times 10^{-5} \times 0,6 \times 10^4 \\ H &= 0,45 \text{ W} \end{aligned}$$

### 3. Perpindahan Kalor secara radiasi

adalah perpindahan kalor secara pancaran tanpa zat perantara misalnya pancaran matahari ke permukaan bumi. Besar energi yang dipancarkan tiap satuan luas dan tiap satuan waktu, yang berbanding lurus dengan pangkat empat suhu mutlak (hukum Stefan - Boltzmann)

Perumusannya:

$$\begin{aligned} W &= e \cdot \tau \cdot T^4 \\ W &= \frac{P}{A} \end{aligned}$$

Dengan:  $e$  = emisifitas benda;  $0 \leq e \leq 1$

$T$  = suhu mutlak (K)

$A$  = luas permukaan ( $\text{m}^2$ )

$P$  = daya pancaran (W)

$\tau$  = tetapan Stefan - Boltzmann =  $5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

Jika suatu benda memiliki suhu permukaan dan sekeliling bersuhu  $T_1$  dan  $T_2$  ( $T_1 > T_2$ ), maka besar energi yang dipancarkan adalah:

$$W = e \cdot \tau \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

∴ Perlu diingat!!

↳ Benda hitam sempurna;  $e = 1$

↳ Benda putih sempurna;  $e = 0$

Contoh soal :

Sebuah plat tipis memiliki total luas permukaan  $0,02 \text{ m}^2$ . Plat tersebut di panaskan dengan sebuah tungku hingga suhunya mencapai  $1.000 \text{ K}$ . Jika emisitas plat  $0,6$ , maka tentukan laju radiasi yang dipancarkan plat tersebut!

Diketahui : a.  $A = 0,02 \text{ m}^2$

b.  $T = 1.000 \text{ K}$

c.  $\epsilon = 0,6$

d.  $\sigma = 5,6705119 \times 10^{-8} \text{ W/mK}^4$

Ditanyakan :  $H = \dots ?$

Jawab :

$$H = Ae\sigma T^4$$


$$= 0,02 \times 0,6 \times (5,6705119 \times 10^{-8}) \times (1.000)^4$$

$$= 6.804 \text{ W}$$

Jadi, laju radiasi yang dipancarkan plat sebesar  $6.804 \text{ W}$ .

## D. Latihan

1. Perhatikan gambar berikut!



Ujung sendok yang dipegang lama kelamaan akan terasa panas. Perpindahan kalor yang terjadi pada gambar di atas adalah..

- a. Konduksi
  - b. Konveksi
  - c. Radiasi
  - d. Pancaran
  - e. Lompatan
- 
2. Sekelompok siswa sesang mengelilini api unggul, maka proses perpindahan kalor yang terjadi adalah...
    - a. Konveksi
    - b. Aliran
    - c. Konduksi
    - d. Radiasi
    - e. Lompatan

3. Tuliskan jenis perpindahan kalor yang terjadi pada gambar di bawah ini:

Perpindahan kalor apa yang terjadi pada gambar di atas	Perpindahan kalor apa yang terjadi pada panci

4. Buat garis ke jawaban yang benar:



Konduksi



Radiasi



Konveksi

5. Tulislah rumus yang sesuai dengan gambar

Perpindahan kalor

Rumus



$$\frac{Q}{t} = k \cdot \frac{A \cdot \Delta t}{\ell}$$



$$W = e \cdot \tau \cdot T^4$$



$$\frac{Q}{t} = h \cdot A \cdot \Delta t$$

#### E. Daftar Pustaka

1. Aip Saparudin. 2009. *Praktis Belajar Fisika untuk Kelas X SMA/MA*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional (hal 107-124)
2. Dudi Indrajit. 2009. *Mudah dan Aktif Belajar Fisika untuk Kelas X SMA/MA*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional (hal 147-167)
3. Marthen Kanginan. 2007. *Fisika 1 untuk SMA Kelas X*. Cimahi: Erlangga ( hal 217 – 264)

4. Setya Nurachmandani. 2009. *Fisika 1 untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional (hal 149-174)
5. Sri Handayani. 2009. *Fisika 1 : Untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional (145 – 160)