EVALUACIÓN PARCIAL: MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Examen de Correlación de Conceptos - Infecciones Agudas de la Vía Aérea Superior

Nombre del Alumno: _____ **Fecha:** _____

Grupo / Grado: _____ **Calificación:** _____

Instrucciones generales: Relaciona de manera correcta los conceptos, microorganismos o hallazgos clínicos de la **Columna A** con su correspondiente descripción, definición o fundamento patológico ubicado en la **Columna B**. Escribe la letra mayúscula correcta dentro del paréntesis de la columna central. Cada reactivo tiene un valor de 10 puntos (Total: 100 puntos). Evita tachaduras, enmendaduras o usar corrector.

COLUMNA A: Concepto / Agente	Sél.	COLUMNA B: Definición, Clínica o Fisiopatología
1. Parainfluenzavirus tipo 1	( )	**A.** Hallazgo radiológico característico en sinusitis que se moviliza con el decúbito lateral y posee una estrecha correspondencia con la positividad del cultivo del aspirado sinusal.
2. *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*	( )	**B.** Agente etiológico viral más importante en el origen de la laringotraqueítis aguda (crup), con picos de incidencia máxima durante otoño e invierno.
3. *Streptococcus pyogenes*	( )	**C.** Estudio radiológico simple empleado de primera línea para evaluar los senos maxilares y frontales, útil para descartar obstrucciones ostiales.
4. Signo de la huella digital	( )	**D.** Microorganismos bacterianos que representan las causas más frecuentes de sinusitis aguda, siendo responsables del 70% de los casos.
5. Tumor turgente de Pott	( )	**E.** Principal estreptococo β-hemolítico causante de faringitis aguda bacteriana en niños de 2 a 10 años, requiriendo antibioticoterapia pronta para prevenir complicaciones supurativas y no supurativas.
6. Agonistas α_1-adrenérgicos tópicos	( )	**F.** Hallazgo radiológico visible en la proyección lateral de cuello debido al engrosamiento marcado de la epiglotis edematosa y la consecuente dilatación hipofaríngea.
7. Proyección de Waters	( )	**G.** Manifestación inicial clínica de una sinusitis frontal avanzada que cursa con tumefacción localizada y edema blando en el hueso frontal a causa de un absceso subperióstico.
8. Virus Coxsackie A	( )	**H.** Fármacos descongestionantes eficaces que reducen la vasodilatación y el incremento de permeabilidad vascular, pero cuyo uso continuado por más de 3 o 4 días seguidos produce rinitis medicamentosa.
9. Punción directa de los senos	( )	**I.** Patógeno causante de la herpangina infantil, caracterizada clínicamente por lesiones eritematovesiculosas típicas localizadas en la mucosa faringoamigdalar.
10. Nivel hidroaéreo	( )	**J.** Procedimiento invasivo que constituye el estándar clínico para el diagnóstico de seguridad de la sinusitis bacteriana aguda, indicado ante la falta de respuesta terapéutica.

LIVEWORKSHEETS