

Première Partie :

Les ondes

Unité 3

5 H

Propagation d'une onde lumineuse

انتشار موجة ضوئية



2^{ème} Bac Sciences
Physique

I – Diffraction de la lumière :

1– Activité :

On éclaire une **fente**, de **largeur a variable**, par un **faisceau de laser** comme illustré par la **figure** ci-contre.

a- Qu'observez-vous sur l'**écran** lorsque la **largeur** de la **fente** devient **grande** ?

On voit une **seule tache lumineuse**.

b- Qu'observez-vous sur l'**écran** lorsque la **largeur** de la **fente** devient **petite** (voir la **figure**) ?

On observe **plusieurs taches** avec des **éclaircissements maximaux (franges brillantes)** séparées par des **taches sombres (franges foncées)**.

c- Est-ce que la **direction** de **propagation** de la **lumière** a changée dans les **deux cas** ?

Dans le **premier cas**, on observe que la **direction** de la **propagation** des **rayons lumineux** ne change pas, alors que la **direction** de la **propagation** des **rayons lumineux** change dans le **deuxième cas** afin qu'il puisse **atteindre** les endroits au-delà de l'**obstacle** ce qui est contraire au **principe** de **propagation rectiligne** de la **lumière**.

d- Avez-vous déjà rencontré comme ce **phénomène** dans le **cas** des **ondes mécaniques** ?
Donne le **nom** de ce **phénomène**.

Oui, il s'appelle **phénomène de diffraction**.

e- Que peut-on conclure a propos de la **nature** de la **lumière** ?

Par analogie avec les **ondes mécaniques**, on considère que la **lumière** est une **onde électromagnétique**.

2– Concept de diffraction de la lumière :


Dans le vide ou dans un milieu matériel, la lumière se propage à partir de la source en ligne droite.

Lorsqu'on éclaire une **fente** de **petite largeur a** , on observe sur l'**écran** des **taches lumineuses (franges brillantes)** et autres **sombres (franges foncées)** où la **fente** se comporte comme une **source lumineuse** et ce **phénomène** est appelé **phénomène de diffraction** où la **direction** de la **diffusion** des **rayons lumineux** **change** pour atteindre des **endroits** au-delà de l'**obstacle**.

L'écran dans le cas d'une ouverture rectangulaire



L'écran dans le cas d'un trou circulaire



3- Modèle ondulatoire de la lumière :


Si on se limite à la **propagation rectiligne de la lumière**, on ne peut pas expliquer l'arrivée de la **lumière** à des **endroits** situés au-delà de l'**obstacle**. Et **par analogie** avec les **ondes mécaniques**, on considère que la **lumière est une onde longitudinale électromagnétique** (association d'un **champ électrique** et d'un **champ magnétique**) se propage dans les **milieux transparents matériels et non matériels**.

Elle a une **double périodicité** :

- ✎ **Périodicité temporelle** : est caractérisée par la **période T** ou la **fréquence ν** telle que $\nu = \frac{1}{T}$ et elles ne dépendent pas de la **nature de milieu de propagation**.
- ✎ **Périodicité spatiale** : est caractérisée par la **longueur d'onde λ** et elle dépend de la **nature de milieu de propagation**.


Remarques :

- ⊕ On obtient la **diffraction** de la **lumière** par une **fente** de **largeur a** lorsqu'elle est : $10 \lambda \leq a \leq 100 \lambda$.
- ⊕ Si le **milieu de propagation** ne change pas, l'**onde incidente** et l'**onde diffractée** ont la **même longueur d'onde λ** , la **même période T** et la **même vitesse de propagation V** , telle que : $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$.
- ⊕ Au cours de la **diffraction d'une onde lumineuse monochromatique** de **longueur d'onde λ** , par une **fente** de **largeur a** (ou un **fil** de **diamètre a**), l'**écart angulaire de diffraction θ** est le **demi-angle** qui délimite le **centre** de la **tâche centrale** jusqu'au **centre** du **première tâche sombre** tel que : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ ou $\theta = \frac{L}{2D}$.
- ⊕ Le **phénomène de diffraction** est **plus important** lorsque la **largeur de la fente** est **petite** ou la **longueur d'onde** de la **lumière monochromatique** utilisée est **grande**.



4- Propriétés de l'onde lumineuse :

- ① On appelle une **lumière monochromatique** chaque **lumière** qui ne **disperse** pas après avoir traversé un **prisme**, c'est une **onde progressive sinusoïdale** caractérisée par la **fréquence ν** et **vitesse V** .
- ① La **lumière** se **propage** dans le **vide** avec une **vitesse** (nommée **célérité**) $c = 29979245 \text{ m.s}^{-1} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$, mais dans un **milieu matériel**, cette **vitesse V** devient **inférieure** à c .
- ① On appelle la **vitesse** de **propagation** d'une **onde lumineuse** dans un **milieu matériel**, la **grandeur $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$** mais dans le **vide** c'est $c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 \cdot \nu$.
- ① **Domaine des ondes lumineuses visibles** :



II – Dispersion des ondes lumineuses :

1– Indice de réfraction :

Le **rayon lumineux** est **réfracté** en passant d'un **milieu de propagation** à l'autre, et **chaque milieu** est caractérisé par un **indice de réfraction** noté **n** , et défini par la relation suivante : **$n = \frac{c}{v}$** (**$n \geq 1$**).

Où **c** célérité de l'onde dans le vide **$c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$** avec **$c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 \cdot v$**
 λ_0 la longueur de l'onde dans le vide .

V vitesse de propagation de l'onde dans le milieu **$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot v$**

λ la longueur de l'onde dans le milieu .

Alors **$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{c}{\lambda v}$** , donc l'**indice de réfraction** d'un certain **milieu** dépend de la **fréquence** de l'**onde lumineuse** dans lequel se propage.


Rayon	Rouge	Orange	Jaune	Bleu	Violet
Longueur d'onde $\lambda(\text{nm})$	768	656	589	486	434
Indice de refraction n	1,618	1,627	1,629	1,641	1,652

2– Loi de réfraction de Descartes :

2-1- Activité :

On envoie un **faisceau** émis de la **source** du **laser** à la **face** du **prisme**.

a- Décrire ce que vous regardez à l'**écran**. Est-ce que le **principe** de **propagation rectiligne** de la **lumière** est **vérifié** ?



Une **tache rouge** apparaît à l'**écran** et le **principe** de **propagation rectiligne** de la **lumière** n'est pas **vérifié** car il y avait des **réfractions** du **faisceau**.

b- Combien de **réfraction** a subi le **faisceau lumineux** après avoir traversé le **prisme** ?

Le **faisceau lumineux** a subi **deux réfractions** .

c- Rappeler la **deuxième loi** de **Descartes**.

L'**angle d'incidence** et l'**angle de réfraction** sont liés par : **$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2$**

2-2- Loi de réfraction de Descartes :


Le **rayon lumineux** change la **direction** en passant d'un **milieu de propagation** à l'autre milieu de **propagation**, cette **transition** est soumise à la **loi de réfraction** de **Descartes** : **$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$**

avec **n_1** : indice de réfraction du milieu 1 **n_2** : indice de réfraction du milieu 2
et **i_1** : angle d'incidence sur le milieu 1 **i_2** : angle de réfraction sur le milieu 2

3– Relations caractéristiques de prisme :

Le **prisme** est un **milieu transparent et homogène**, limité par **deux plans inclinés** définit entre eux un **angle A** s'appelle l'**angle du prisme**.

Soit **n** l'indice de **réfraction** de **milieu** formant le **prisme** et on considère **$n = 1$** l'indice de **réfraction** de l'**air** où il y a le **prisme**.



Le prisme est caractérisé par les relations suivantes :

D : L'angle de déviation du rayon lumineux par le prisme.

4- Dispersion de la lumière par le prisme :

Lorsqu'on envoie un **faisceau de lumière blanche** sur une **face d'un prisme**, cette **onde** a subi le **phénomène de réfraction deux fois**, et on observe sur l'écran la **formation des taches colorées** s'appelle **spectre de la lumière blanche**, et on appelle ce **phénomène** qui permet la **séparation des rayonnements de différentes couleurs** par **la dispersion de la lumière**, et on appelle le **prisme un milieu dispersif de la lumière**.

Le **phénomène de dispersion** de la **lumière** par **prisme** montre que la **lumière blanche** est composée de **plusieurs couleurs** du **spectre de la lumière visible**, On dit que la **lumière blanche** est **polychromatique** et que chaque **lumière (couleur)** du spectre est appelée **lumière monochromatique**.

5- Explication du phénomène de dispersion :

On sait que l'**indice de réfraction n** du **milieu** est lié à la **longueur d'onde du rayon** qu'il le traverse

$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda} \quad \text{c-à-d la couleur.}$$

Le **faisceau lumineux incident** au **prisme** est **cylindrique**, c-à-d les **rayons** sont **parallèles entre eux**, alors tous les **lumières monochromatiques** formant la **lumière blanche** ont le **même angle d'incidence i** .

Par exemple : pour les **rayons rouge et violet**, on a **$n_R = n_V$** (car ont pas la **même longueur d'onde**)

En appliquant les **relations du prisme** :

$$\begin{aligned} \sin i &= n \sin r \Rightarrow r_R \neq r_V \\ A &= r + r' = \text{cte} \Rightarrow r'_R \neq r'_V \\ \sin i' &= n \sin r' \Rightarrow i'_R \neq i'_V \\ D &= i + i' - A \Rightarrow D_R \neq D_V \end{aligned}$$

Ainsi, les **deux rayons rouge et violet** n'ont pas la **même direction finale**. Donc on remarque que :

$$\begin{aligned} D_V &> D_B > D_{Vr} > D_J > D_{Or} > D_R \\ \text{violet} & \text{bleu} & \text{vert} & \text{Jaune} & \text{Orange} & \text{Rouge} \\ \lambda_V &< \lambda_B < \lambda_{Vr} < \lambda_J < \lambda_{Or} < \lambda_R \end{aligned}$$

Donc, l'indice de réfraction d'un milieu transparent est lié à la fréquence des rayons lumineux, ce qui provoque le phénomène de dispersion de la lumière.

$$\begin{aligned} \sin i &= n \sin r \\ \sin i' &= n \sin r' \\ A &= r + r' \\ D &= i + i' - A \end{aligned}$$

