

1. L'ordine con cui controllo le funzioni vitali è:
  - a. coscienza – respiro – circolo
  - b. circolo – coscienza – respiro
  - c. coscienza – circolo – respiro
2. La frequenza cardiaca di un adulto a riposo è:
  - a. 20-40 battiti al minuto
  - b. 60-80 battiti al minuto
  - c. 120-200 battiti al minuto
3. In corso di intossicazione
  - a. dare da bere, meglio se latte
  - b. raccogliere un campione della sostanza che ha provocato l'intossicazione
  - c. controllare la sicurezza, valutare le funzioni vitali, chiamare il 118 e raccogliere più informazioni possibili
4. Il rapporto compressione/ventilazione in corso di RCP è:
  - a. 2/30
  - b. 15/1
  - c. 30/2
5. Telefonando al 118:
  - a. devo dire quanti sono gli infortunati
  - b. non serve dire come stanno
  - c. non importa dire dove sono
6. Le fratture:
  - a. non possono provocare lesioni vascolari
  - b. non provocano dolore
  - c. sono lo spostamento di un osso rispetto ad un altro
7. La prima cosa da valutare sulla scena del soccorso è:
  - a. il battito cardiaco
  - b. le vie aeree
  - c. la sicurezza
8. In corso di emorragia:
  - a. devo usare per primo il laccio emostatico per bloccare il sanguinamento
  - b. non proteggersi le mani
  - c. comprimere manualmente la ferita e allertare il 118
9. In caso di svenimento (la perdita temporanea di coscienza):
  - a. iniziare l'RCP
  - b. mettere il soggetto in posizione prona
  - c. nessuna delle precedenti
10. Per epistassi si intende:
  - a. sanguinamento dalla bocca
  - b. sanguinamento dall'orecchio
  - c. sanguinamento dal naso
11. In caso di ustione si deve valutare:
  - a. primo, secondo e terzo grado e regola del 9
  - b. se il paziente è agitato
  - c. l'ora dell'ultimo pasto
12. In caso di infarto:
  - a. somministrare al soggetto i suoi farmaci
  - b. somministrare un bicchiere d'acqua
  - c. controllare le funzioni vitali e chiamare il 118
13. Frequenza respiratoria di un adulto a riposo è:
  - a. 12-16 atti al minuto
  - b. 20- 40 atti al minuto
  - c. 2-8 atti al minuto
14. Se il paziente non è cosciente ma respira devo:
  - a. iniziare immediatamente RCP
  - b. metterlo in PLS
  - c. non avvertire il 118