ชื่อ-สกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

การเจริญเติบโต

จงเลือกตัวอักษรหน้าคำที่กำหนดให้เติมลงหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน

A. โอโอไซต์ระยะแรก	B. โอโอไซต์ระยะที่สอง	C. แกสทรูลา
D. ท่อนำาไข่	E. แอลแลนทอยส์	F. รก
G. การแบ่งเซลล์	H. คลีเวจ	I. คอร์ปัสลูเทียม
J. บลาสทูลา	K. ออร์แกโนเจเนซิส	L. เซลล์ไข่

..... เซลล์ที่หลุดออกจากฟอลลิเคิลเข้าสู่ท่อนำาไข่ในกระบวนการตกไข่

..... โครงสร้างที่ลำาเลียงสารอาหารและแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนระหว่างแม่กับลูก

..... การที่ไซโกตมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างรวดเร็วในกระบวนการเจริญเติบโตของกบ

..... เอ็มบริโอในระยะที่มีการจัดเรียงตัวของกลุ่มเซลล์เป็น 3 ชั้น คือ เอ็กโทเดิร์ม เมโซเดิร์ม และเอนโดเดิร์ม

..... โครงสร้างของเอ็มบริโอไก่ที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สและเก็บของเสียประเภทกรดยูริก

.....โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมาจากฟอลลิเคิล ทำาหน้าที่สร้างโพรเจสเทอโรน

LIVEWORKSHEETS

จงเลือกเฉพาะข้อความที่ถูกต้อง หากข้อความใดไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนระบุข้อความที่ถูกต้องในช่องว่างที่กำหนด

- การที่มีปริมาณและการกระจายของไข่แดงในเซลล์ไข่ไม่เท่ากันทำให้สัตว์มีลักษณะการแบ่งเซลล์ในคลีเวจของเอ็มบริโอต่างกัน

  แก้ไข.....

- ในคลีเวจพบว่าเอ็มบริโอมีการเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็ว

  แก้ไข.....

- การแบ่งเซลล์ในคลีเวจอัตราส่วนพื้นที่ผิวของเซลล์ต่อปริมาตรจะลดลง

  แก้ไข.....

- ถุงน้ำคร่ำของไก่เป็นถุงบรรจุของเหลวทำหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือน และไม่ให้เอ็มบริโอแห้ง คอเรียนของไก่เป็นถุงทำหน้าที่สะสมอาหาร

  แก้ไข.....

- เยื่อหุ้มไข่ขาวของไข่ไก่ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายและการสูญเสียน้ำของเซลล์

  แก้ไข.....

- สมอง ไขสันหลัง เล็บ เลนส์ตา และโนโทคอร์ด เป็นอวัยวะที่เจริญมาจากเอ็กโทเดิร์มของเอ็มบริโอ

  แก้ไข.....

- ถุงน้ำคร่ำพบได้ทั้งในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  แก้ไข.....

- ฟีตัสได้รับสารอาหารและแก๊สออกซิเจนจากรกผ่านทางสายสะดือ

  แก้ไข.....

LIVEWORKSHEETS