




Vật chủ trung gian là ốc gạo, ốc mút.
Đầu sán nhỏ, có giác bám. Thân dài nhiều đốt. Mỗi đốt có 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính. Các đốt cuối chứa nhiều trứng
Kí sinh ở ruột non người và cơ bắp trâu bò.
Ấu trùng chui qua da khi tiếp xúc với nước ô nhiễm. Ruột tiêu giảm
Kí sinh ở máu người
Cơ quan tiêu hóa và sinh dục phát triển giống sán lá gan.
Cơ thể phân tính, con cái to, dài; con đực nhỏ, đuôi cong
Vòng đời: Trâu, bò ăn phải trứng ấu trùng, phát triển thành nang sán (gạo). Người ăn phải thịt bò, lợn có gạo → mắc bệnh sán dây
Vòng đời: Trứng theo phân ra ngoài gặp ẩm và thoáng khí phát triển thành ấu trùng trong trứng. Người ăn phải trứng giun qua (rau sống, quả tươi) vào ruột non, chui ra vào máu → tim → gan → phổi → khí quản qua thực quản xuống ruột lần 2 và kí sinh ở đó.
Có lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể luôn căng tròn → giúp giun không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa trong ruột non người
Cơ thể phân tính, con đực cặp con cái trong một rãnh phía bụng
Kí sinh ở ruột non người
Kí sinh ở ruột non lợn
Giun đũa
Sán dây
Sán bã trầu
Sán lá máu