

วง ○ รอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

(ข้อ ๑-๕ ประเมินตัวชี้วัด พ ๕.๑ ข้อ ๒)

๑. การใช้ยาชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเกิดผลเสียอย่างไร
ก. เชื้อโรคดื้อยา
ข. มีอาการติดยา
ค. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ง. ยาเสื่อมคุณภาพเร็ว
๒. ข้อใดคือลักษณะของการแพ้ยา
ก. กินอาหารได้น้อย
ข. เหงื่อออกมาก
ค. ผดผื่นคัน
ง. ปากบวม
๓. หลังใช้ยาแล้ว มีอาการผื่นคันที่ผิวหนัง ควรทำอย่างไร
ก. หยุดใช้ยาทันที
ข. ลดปริมาณยาในครั้งต่อไป
ค. เพิ่มปริมาณยาเป็น ๒ เท่า
ง. ลองใช้ยาอีกครั้งเพื่อดูผลการใช้
๔. เมื่อกินยาแก้แพ้แล้ว ไม่ควรขับรถ เพราะอะไร
ก. จะทำให้ตื่นเต้น
ข. จะทำให้ง่วงนอน
ค. จะทำให้อยากกินอาหาร
ง. จะทำให้มองไม่เห็นทาง
๕. การใช้ยานอนหลับติดต่อกันเป็นเวลานานๆ มีผลเสียอย่างไร
ก. ง่วงนอนมาก ข. ติดยา
ค. หน้าบวม ง. เกิดผดผื่นคัน

(ข้อ ๖-๑๐ ประเมินตัวชี้วัด พ ๕.๑ ข้อ ๓)

๖. ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด
ก. ใช้ยาตามวิธีที่เขียนไว้บนฉลากยา
ข. ใช้ยาตามที่แม่เคยบอกไว้
ค. ใช้ยาตามที่เคยกิน
ง. ใช้ยาเมื่อจำเป็น
๗. ถ้าฉลากยาหลุดหายไป ควรทำอย่างไร
ก. ถ้ายายังไม่หมดอายุก็เก็บไว้ใช้ได้
ข. นำยาไปเก็บในตู้ยา
ค. หาฉลากใหม่มาติด
ง. นำยาไปทิ้ง
๘. เราไม่ควรหยิบยาที่มีลักษณะใดมาใช้
ก. ยาที่มีฉลากสีแดง
ข. ยาหยอดตาที่เปิดไว้ ๑ วัน
ค. ยาแคปซูลที่เม็ดไม่โป่งพอง
ง. ยาเม็ดที่อยู่ในขวดมีฉลากระบุ
๙. สิ่งที่เราควรทำก่อนกินยาคือข้อใด
ก. ชิมรสชาติ
ข. เตรียมน้ำดื่ม
ค. เขย่าขวดดูสียา
ง. อ่านฉลากข้างขวด
๑๐. ใครใช้ยาไม่ถูกวิธี
ก. โต้งกินยาหลังอาหารครึ่งชั่วโมง
ข. เดือนทาแอลกอฮอล์รอบแผล
ค. มดกินยาแก้ปวด ๓ เม็ด
ง. จอยดมแอมโมเนียหอม