GIẢM PHÂN I

Cho các thông tin sau:

1) NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn.

2) Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép tạo ra 2 tế bào con có bộ NST n kép.

3) Sau khi đi về 2 cực của tế bào, các NST kép dần dần dãn xoắn.

4) NST tiếp tục co xoắn cực đại.

5) Cuối kì đầu, 2 NST kép tách nhau ra.

6) Dây tơ phân bào đính vào tâm động ở 1 phía của NST.

7) Thoi phân bào tiêu biến, màng nhân và nhân con hình thành.

8) Màng nhân và nhân con tiêu biến.

Em hãy hoàn thành bảng sau:

Các kì	Diễn biến
Kì đầu I	- Các cặp NST kép trong cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với nhau và trao đổi chéo có thể xảy ra giữa 2 cromatit khác nguồn gốc.
Kì giữa I	- Các cặp NST tương đồng tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Kì sau I	- Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo dây tơ phân bào về 1 cực của tế bào.
Kì cuối I	
Kết quả	

LIVEWORKSHEETS