

ไบโอม

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อมูลที่กำหนดให้แล้วบอกว่าเป็นไบโอมชนิดใด

ไบโอมทุนดรา

ไบโอมป่าสน

ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น

ไบโอมทะเลทราย

ไบโอมป่าผลัดใบเขตอบอุ่น

ไบโอมป่าเขตร้อน

ไบโอมสะวันนา



• ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 20 - 60 เซนติเมตร ฤดูหนาวยาวนาน แต่ฤดูร้อนสั้น สัตว์ที่พบ เช่น วัวมัสก์ (musk ox) นกอพยพหลายชนิด พบพืชส่วนใหญ่เป็น มอส หญ้า พืชล้มลุกขนาดเล็ก



• ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 30 - 70 เซนติเมตร ฤดูหนาวจะหนาวมากและยาวนาน ฤดูร้อนจะอุ่นขึ้น พืชจำพวกสนเป็นพืชเด่น เช่น ไพน์ (pine) สปรูซ (spruce)



• โดยทั่วไปปริมาณหยาดน้ำฟ้าต่ำกว่า 30 เซนติเมตรต่อปี ในบางแห่งอุณหภูมิอาจสูงถึง 50 องศาเซลเซียส พืชที่พบส่วนใหญ่เป็นพืชอวบน้ำ สัตว์ที่พบมีการปรับตัวให้อยู่ในทะเลทรายได้ดี



• ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 30 - 100 เซนติเมตร ฤดูหนาวมักแห้งแล้ง พืชจำพวกหญ้าและพืชล้มลุกขนาดเล็กเป็นพืชเด่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดที่พบเป็นพวกแพะเล็มหญ้า เช่น ไบซัน (bison) หรือพวกซูดรูอยู่ในดิน เช่น



• ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 70 - 200 เซนติเมตร สังคมพืชเป็นไม้ต้นใบกว้าง ผลัดใบก่อนถึงช่วงฤดูหนาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดจำศีลในฤดูหนาว นกจะอพยพไปที่อุ่นกว่าในฤดูหนาว



• ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 30 - 100 เซนติเมตร ฤดูหนาวมักแห้งแล้ง พืชจำพวกหญ้าและพืชล้มลุกขนาดเล็กเป็นพืชเด่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดที่พบเป็นพวกแพะเล็มหญ้า เช่น ไบซัน (bison) หรือพวกซูดรูอยู่ในดิน เช่น แพรรีด็อก



• ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 70 - 200 เซนติเมตร สังคมพืชเป็นไม้ต้นใบกว้าง ผลัดใบก่อนถึงช่วงฤดูหนาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดจำศีลในฤดูหนาว นกจะอพยพไปที่อุ่นกว่าในฤดูหนาว