



Nombre Estudiante:

UNIDAD 2: RAZONES Y PROPORCIONES
Preparación para la Prueba

1. Una razón equivalente a $\frac{32}{40}$ es

- A) $\frac{8}{10}$
- B) $\frac{16}{5}$
- C) $\frac{16}{10}$
- D) $\frac{10}{8}$
- E) $\frac{8}{16}$

2. ¿Cuál(es) de los siguientes pares de razones forman una proporción?

- I) 15 : 36 y 20 : 12
- II) 21 : 9 y 35 : 15
- III) 16 : 12 y 20 : 15

- A) Solo I
- B) Solo II
- C) Solo I y III
- D) Solo II y III
- E) I, II y III

3. Si $\frac{6}{x} = \frac{8}{12}$, entonces, **2x** =

- A) 81
- B) 18
- C) 12
- D) 9
- E) 6



4. Si $A : B = 5 : 3$ y $A + B = 16$, entonces, $A \cdot B$ es igual a

- A) 15
- B) 16
- C) 24
- D) 40
- E) 60

5. La razón entre el número de preguntas de una prueba y la cantidad de minutos asignados para responderla es $14 : 27$. Si la prueba consta de 70 preguntas, ¿cuántos minutos son los asignados para responderla?

- A) 27
- B) 41
- C) 82
- D) 135
- E) 270

6. Si $a : b = 3 : 4$ y $b : c = 12 : 20$, entonces $a : b : c =$

- A) $9 : 12 : 60$
- B) $3 : 12 : 20$
- C) $3 : 4 : 20$
- D) $9 : 12 : 20$
- E) $9 : 4 : 60$

7. La razón entre lo que gasta y lo que ahorra mensualmente una persona es $7 : 2$. Si sus ahorros este mes fueron de \$ 148.000, entonces ¿cuál es su sueldo?

- A) \$ 1.184.000
- B) \$ 1.036.000
- C) \$ 666.000
- D) \$ 518.000
- E) Ninguna de las anteriores



COLEGIO PUCÓN
Augusto Maldonado

8. Si $\frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{2}$ y $a + b + c = 40$, entonces $3a + b - 2c =$

- A) 10
- B) 16
- C) 40
- D) 32
- E) 22


9. En la tabla adjunta, **A** y **B** son magnitudes directamente proporcionales, entonces $x^2 - y =$

- A) -41
- B) -1
- C) 1
- D) 7
- E) 48

A	x	8	2
B	42	y	12

10. En el gráfico de la figura adjunta, **x** e **y** son variables directamente proporcionales, entonces el valor de $(2a - 1)$ es

- A) 0,25
- B) 0,50
- C) 1,25
- D) 1,50
- E) 2,50





11. ¿Cuál(es) de las siguientes tablas corresponde(n) a dos variables inversamente proporcionales?

I)

x	y
2	36
3	24
4	18
6	12

II)

x	y
3	6
4	8
7	14
9	18

III)

x	y
40	1
20	2
10	4
5	8

- A) Solo I
- B) Solo II
- C) Solo I y II
- D) Solo I y III
- E) Solo II y III

12. Por x cajas navideñas que se compraron, se pagó \$ p . Si todas las cajas tenían el mismo precio, ¿cuánto se hubiese pagado, en pesos, al comprar 3 cajas más?


- A) \$ $p + \frac{3}{x}$
- B) \$ $\frac{p}{x + 3}$
- C) \$ $\frac{p}{x} + 3$
- D) \$ $\frac{p(x + 3)}{x}$
- E) \$ $\frac{x + 3}{p}$



COLEGIO PUCÓN
Augusto Maldonado

13. Las variables x e y de la figura adjunta, son inversamente proporcionales, entonces $3m - 2n$ es igual a

- A) 10,5
- B) 42,0
- C) 21,0
- D) 17,5
- E) 14,0



14. Las cantidades a^2 y b son inversamente proporcionales. Si para $a = 2$, se obtiene $b = 3$, ¿cuál sería el valor de a asociado a $b = 27$?

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{4}{9}$
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $\frac{3}{4}$
- E) $\frac{3}{2}$

15. Si 15 obreros construyen un edificio en 8 meses, ¿cuánto tiempo se demorarían 10 obreros en construir un edificio similar, trabajando el mismo número de horas al día y en igualdad de condiciones de trabajo?

- A) 5,3 meses
- B) 6 meses
- C) 9 meses
- D) 10 meses
- E) 12 meses



COLEGIO PUCÓN
Augusto Maldonado

16. La razón entre el contenido de un estanque y su capacidad es 2:3. Si para llenarlo faltan 15 litros, entonces ¿cuál es la capacidad del estanque?

- A) 15 litros
- B) 20 litros
- C) 25 litros
- D) 30 litros
- E) 45 litros

17. El 15% del 5% de 20.000 es

- A) 150
- B) 400
- C) 1.500
- D) 4.000
- E) 7.500

18. Pedro gastó \$ 144.000 lo que equivale al 25% de su sueldo mensual, entonces su sueldo mensual es

- A) \$ 602.000
- B) \$ 570.000
- C) \$ 555.000
- D) \$ 569.000
- E) \$ 576.000

19. Si en un curso el puntaje en Matemática aumentó de una jornada a otra de 480 puntos a 540 puntos, entonces el porcentaje de aumento fue

- A) $11,\bar{1}\%$
- B) 12,5%
- C) 60%
- D) $88,\bar{8}\%$
- E) 112,5%



COLEGIO PUCÓN
Augusto Maldonado

20. José recibe actualmente un sueldo mensual de \$ 580.000 y el próximo mes éste será incrementado en un 5%. ¿Cuál será su nuevo sueldo?

- A) \$ 609.000
- B) \$ 619.000
- C) \$ 696.000
- D) \$ 870.000
- E) \$ 1.102.000

21. Eduardo le vendió a su amigo Sebastián un libro de Sudoku en \$ 5.600 con un 25% de ganancia. Entonces, Eduardo ganó

- A) \$ 1.020
- B) \$ 1.120
- C) \$ 1.400
- D) \$ 4.200
- E) \$ 4.480

22. En un corral hay pavos blancos y pavos castellanos. Si $\frac{3}{8}$ son blancos, ¿qué porcentaje son los pavos blancos de los pavos castellanos?

- A) 37,5%
- B) 40%
- C) 60%
- D) 62,5%
- E) 67,5%

23. El precio de un artículo es \$C. Si este se aumenta en un 15% y luego se rebaja en un 10%, ¿por qué número se debe multiplicar C para obtener el nuevo precio?

- A) 1,005
- B) 1,035
- C) 1,35
- D) 1,09
- E) 1,05



24. Juan deposita en un Banco \$ 10.000.000 a un interés simple trimestral del 4%. Al cabo de 9 meses, ¿cuánto es el capital final?

- A) \$ 10.400.000
- B) \$ 11.180.000
- C) \$ 11.200.000
- D) \$ 12.700.000
- E) \$ 13.600.000

25. ¿Cuál es la ganancia, en U.F., que se obtiene al cabo de 2 meses al depositar 2.000 U.F. a un interés compuesto mensual del 5%?

- A) 250
- B) 205
- C) 200,5
- D) 200
- E) 195

26. Sean **a** y **b** números positivos. Se puede determinar en que razón están las cantidades **a** y **b**, si:

- (1) El doble de **a** es equivalente al triple de **b**.
- (2) La diferencia entre **a** y **b** es 10.

- A) (1) por sí sola
- B) (2) por sí sola
- C) Ambas juntas, (1) y (2)
- D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
- E) Se requiere información adicional

27. Se puede determinar el 60% de **p**, si se sabe que:

- (1) El 45% de **p** es 27.
- (2) El 300% de **p** es igual al 30% de **q**.

- A) (1) por sí sola
- B) (2) por sí sola
- C) Ambas juntas, (1) y (2)
- D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
- E) Se requiere información adicional



28. En un mall hay 2.500 empleados entre hombres y mujeres. Se puede determinar el número de hombres que trabajan en él, si se sabe que:

- (1) El 80% de los empleados son mujeres.
- (2) El número de hombres equivale al 25% del número de mujeres.

- A) (1) por sí sola
- B) (2) por sí sola
- C) Ambas juntas, (1) y (2)
- D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
- E) Se requiere información adicional

29. Dados p y q reales positivos, se puede determinar qué porcentaje es p de q , si se sabe que:

- (1) $p + q = 100$
- (2) $80p - 50q = 0$

- A) (1) por sí sola
- B) (2) por sí sola
- C) Ambas juntas, (1) y (2)
- D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
- E) Se requiere información adicional

30. A un grupo de estudiantes compuesto por hombres y mujeres que están en la razón 5 : 7, respectivamente, se les hace una encuesta preguntándoles si les gusta o no la asignatura de matemática. Se puede determinar el número de mujeres que les gusta matemática, si se conoce:

- (1) La razón entre los que le gusta matemática y los que no les gusta es 1 : 1.
- (2) Los estudiantes encuestados son 300.

- A) (1) por sí sola
- B) (2) por sí sola
- C) Ambas juntas, (1) y (2)
- D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
- E) Se requiere información adicional