

السؤال الأول: أولاً: اختر الإجابة الصحيحة :


1- اعتماداً على قوانين كبلر في أي المواقع (A,B,C,D) تكون سرعة الكوكب هي الأصغر :



- a- الموقع A
b- الموقع B
c- الموقع C
d- الموقع D

2- إذا زادت المسافة بين جسمين للضعف , فإن قوة الجاذبية المتبادلة بينهما
a- تقل للنصف
b- تقل للربع
c- تزداد للضعف
d- تزداد أربعة أضعاف

3- قمران صناعيان (S,P) لهما نفس الكتلة يدوران حول الأرض كما بالشكل .



مامقدار النسبة $\left[\frac{T_p}{T_s} \right]$: حيث T هو الزمن الدوري للكوكب للقمر؟

- a- 2
b- $\sqrt{8}$
c- $\frac{1}{\sqrt{8}}$
d- $\frac{1}{2}$

4- يُحسب الزمن الدوري لدوران قمر صناعي حول الأرض من العلاقة : $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{Gx}}$

ما الكمية الفيزيائية التي يُمثلها الرمز x في المعادلة ؟

- a- كتلة القمر الصناعي
b- كتلة الأرض
c- ثابت الجذب الكوني
d- نصف قطر الأرض

5- احسبي قوة التجاذب الكتلي بين الكرتين في الشكل .



- a- $5.3 \times 10^{-11} \text{ N}$
b- $4.9 \times 10^{-11} \text{ N}$
c- $3.4 \times 10^{-12} \text{ N}$
d- $9.2 \times 10^{-11} \text{ N}$

6- أي الجسمين يُؤثر في الآخر بقوة أكبر ؟

- a- 120
b- متساويتان
c- 150
d- لا يؤثران في بعضهما البعض

- 7- يدور قمر صناعي حول الأرض على ارتفاع (200 km) , فإذا كان :
($r_{\text{الأرض}} = 6.4 \times 10^6 m$) و ($m_{\text{الأرض}} = 6.0 \times 10^{24} m$) أوجد مايلي :
1- الزمن الدوري للقمر الصناعي في مداره حول الأرض

6.2×10^3 -b	6.4×10^6 -a
5.1×10^6 -d	5.3×10^3 -c

- 2- السرعة المدارية للقمر الصناعي في مداره .
 6.4×10^6 -c 7.8×10^3 -a
 7.2×10^5 -d 6.4×10^3 -b

- 3- ماذا يطرأ على السرعة المدارية للقمر الصناعي عند :
• زيادة كتلة القمر الصناعي للضعف .

c- تزداد بمقدار الضعف	a- تقل بمقدار النصف
d- تبقى ثابتة	b- تقل بمقدار الربع

انتهت الأسئلة