Ecuaciones de segundo grado

Resolver ecuaciones de segundo grado paso a paso

1 Resuelve las siguientes ecuaciones poniendo en x_1 la solución menor y en x_2 la mayor:

a) $x^2 + 4x - 5 = 0$

$a = \square$, $b = \square$, $c = \square$ $\rightarrow$ $x = \dfrac{-\square \pm \sqrt{\square^2 - 4 \cdot \square \cdot \square}}{2 \cdot \square} = \dfrac{-\square \pm \square}{\square}$ $\begin{cases} x = \square \\ x = \square \end{cases}$

b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

$a = \square$, $b = \square$, $c = \square$ $\rightarrow$ $x = \dfrac{-\square \pm \sqrt{\square^2 - 4 \cdot \square \cdot \square}}{2 \cdot \square} = \dfrac{\square \pm \square}{\square}$ $\begin{cases} x = \square \\ x = \dfrac{\square}{\square} \end{cases}$

c) $-x^2 + x + 6 = 0$

$a = \square$, $b = \square$, $c = \square$ $\rightarrow$ $x = \dfrac{-\square \pm \sqrt{\square^2 - 4 \cdot \square \cdot \square}}{2 \cdot \square} = \dfrac{-\square \pm \square}{-\square}$ $\begin{cases} x = \square \\ x = \square \end{cases}$

d) $2x^2 - 7x - 4 = 0$

$a = \square$, $b = \square$, $c = \square$ $\rightarrow$ $x = \dfrac{-\square \pm \sqrt{\square^2 - 4 \cdot \square \cdot \square}}{2 \cdot \square} = \dfrac{\square \pm \square}{\square}$ $\begin{cases} x = \square \\ x = -\dfrac{\square}{\square} \end{cases}$

e) $x^2 - 10x + 25 = 0$

$a = \square$, $b = \square$, $c = \square$ $\rightarrow$ $x = \dfrac{-\square \pm \sqrt{\square^2 - 4 \cdot \square \cdot \square}}{2 \cdot \square} = \dfrac{\square \pm \square}{\square} = \square$

f) $x^2 - x + 2 = 0$

$a = \square$, $b = \square$, $c = \square$ $\rightarrow$ $x = \dfrac{-\square \pm \sqrt{\square^2 - 4 \cdot \square \cdot \square}}{2 \cdot \square} = \dfrac{\square \pm \sqrt{-\square}}{\square} = \square$

Ecuaciones de segundo grado

Resolver ecuaciones de segundo grado paso a paso

2 Completa el siguiente cuadro poniendo en x_1 la solución menor y en x_2 la mayor:

	a	b	c	¿TIENE SOLUCIÓN?	x_1	x_2
$5x^2 - 8x = 0$						
$x^2 - 64 = 0$						
$x^2 - 3x + 4 = 0$						
$4x^2 + x - 3 = 0$						