Q.F.B. Celina Flores Pérez

Submódulo: IDENTIFICA MICROORGANISMOS EN BASE A TECNICAS PARASITOLÓGICAS

Tema: *A. lumbricoides y E. vermicularis*

Ejercicio de autoevaluación

Nombre completo _____ Semestre y grupo: _____

Instrucciones: Relaciona las siguientes columnas escribiendo dentro del paréntesis el número correspondiente.

( ) Tiempo que transcurre desde la ingesta del huevo de *A. lumbricoides* hasta que alcanza la etapa adulta en el hospedador.	1. Huevo infértil de *Ascaris lumbricoides*
( ) Estadio evolutivo intectante de *Ascaris lumbricoides.*	2. 6 horas
( ) Tiempo en que un huevo fértil de *A. lumbricoides* en el medio externo (tierra) y condiciones adecuadas de temperatura y humedad se convierte en un huevo embrionado (L2).	3. Ascariasis
( ) Cantidad de huevos que oviposita la hembra fecundada de *Enterobius vermicularis.*	4. Huevo embrionado con larva 1 (L1)
(.) Estadio evolutivo infectante de *Enterobius vermicularis.*	5. 3 a 4 semanas
( ) Estadio evolutivo de forma alargada y con una cubierta protectora formada por una capa.	6. Huevos de oxiuro
( ) Hábitat de *Enterobius vermicularis.*	7. *Ascaris lumbricoides*
( ) Estadio evolutivos de forma ligeramente ovalada o redonda y una cubierta protectora formada por tres capas.	8. oxiuriasis
( ) Parasitosis que produce *Enterobius vermicularis.*	9. *Enterobius vermicularis*
(.) Mide de 3 a 5 mm de longitud y tiene el extremo posterior curvado ventralmente con espícula al final.	10. Intestino grueso (ciego y recto)
( ) Cantidad de huevos que oviposita la hembra fecundada de *Ascaris lumbricoides.*	11. Macho *Ascaris lumbricoides*
( ) Son transparentes, pegajosos, tienen doble membrana y un lado aplanado.	12. 10000 huevos por día
( ) Es un geohelminto.	13. Macho *Enterobius vermicularis*
( ) Tiempo en que son embrionados los huevos de *Enterobuis vermicularis.*	14. 1 A 2 años
( ) Parasitosis que produce *Ascaris lumbricoides.*	15. Huevos embrionados con larva 2 (L2)
( ) Tiempo de vida media de *Ascaris lumbricoides* adulto en el intesino.	16. Dos meses aproximadamente
( ) Proviene de hembras no fecundadas.	17. Intestino delgado
( ) Es el hábitat de *Ascaris lumbricoides* adulto.	18. Huevo fértil de *Ascaris lumbricoides*
	19. 200000 huevos por día