

Completa el siguiente texto con las palabras que consideres sean correctas para que el texto tenga sentido, en cada espacio solo puede haber una palabra.

Los (1)\_\_\_\_\_ son animales que presentan (2)\_\_\_\_\_ (3)\_\_\_\_\_, es decir, una estructura ósea articulada que protege la médula (4)\_\_\_\_\_.

Se diferencian cinco grupos que son: los (5)\_\_\_\_\_, los (6)\_\_\_\_\_, los (7)\_\_\_\_\_, las (8)\_\_\_\_\_ y los (9)\_\_\_\_\_.

Los (10)\_\_\_\_\_ son vertebrados acuáticos que presentan (11)\_\_\_\_\_ para moverse, aunque también pueden tener otras funciones como mantener el (12)\_\_\_\_\_ y virar. Tienen respiración por (13)\_\_\_\_\_, las cuales están protegidas por unas estructuras llamadas (14)\_\_\_\_\_.



A cada lado del cuerpo tienen una estructura, la (15)\_\_\_\_\_ (16)\_\_\_\_\_ en la cual se localiza un sentido especializado al detectar las corrientes de agua. En el aparato digestivo tienen una estructura característica, la (17)\_\_\_\_\_ (18)\_\_\_\_\_ que los permite flotar, cuando se hincha el animal (19)\_\_\_\_\_ mientras que si se deshincha el animal (20)\_\_\_\_\_.

La gran mayoría tienen fecundación (21)\_\_\_\_\_, la hembra pone huevos que después el (22)\_\_\_\_\_ fecunda. De ellos saldrán los alevines que se desarrollarán hasta llegar a ser (23)\_\_\_\_\_. Hay dos tipos, los (24)\_\_\_\_\_, como por ejemplo los (25)\_\_\_\_\_ y las (26)\_\_\_\_\_, y los (27)\_\_\_\_\_, como por ejemplo los (28)\_\_\_\_\_ y las (29)\_\_\_\_\_.

Los (30) \_\_\_\_\_ se llaman así porque pueden vivir tanto en (31) \_\_\_\_\_ como el (32) \_\_\_\_\_. Fueron los primeros al colonizar el medio (33) \_\_\_\_\_ aunque necesitan volver al agua para (34) \_\_\_\_\_. En los ojos tienen (35) \_\_\_\_\_ que son una adaptación para evitar la (36) \_\_\_\_\_. Son capaces de emitir sonidos y por esta razón han desarrollado el (37) \_\_\_\_\_ que es una membrana capaz de detectarlos. Tienen cuatro (38) \_\_\_\_\_, las anteriores y las (39) \_\_\_\_\_, éstas más (40) \_\_\_\_\_ para la natación y poder (41) \_\_\_\_\_. En general se alimentan de (42) \_\_\_\_\_ que atrapan con la (43) \_\_\_\_\_. Su respiración es por (44) \_\_\_\_\_ y (45) \_\_\_\_\_. Por eso la tienen que mantener siempre (46) \_\_\_\_\_. Todos tienen fecundación (47) \_\_\_\_\_. El macho (48) \_\_\_\_\_ a la hembra que pone huevos y los (49) \_\_\_\_\_ inmediatamente. De ellos saldrán las crías, llamadas (50) \_\_\_\_\_ las cuales mediante un proceso llamado (51) \_\_\_\_\_ se desarrollarán hasta llegar al estado (52) \_\_\_\_\_. Algunos ejemplos son las (53) \_\_\_\_\_ y los (54) \_\_\_\_\_.



Los (55) \_\_\_\_\_ se llaman así por la forma que tienen de desplazarse que es (56) \_\_\_\_\_. Están adaptados completamente al medio (57) \_\_\_\_\_. Tienen la piel cubierta de (58) \_\_\_\_\_ que los protege de deshidratarse. Algunos como las (59) \_\_\_\_\_ pueden desencajar las (60) \_\_\_\_\_ para ingerir la presa que ha sido detectada antes con la ayuda de la lengua (61) \_\_\_\_\_ lugar donde tienen el sentido del olfato. En general se alimentan de animales por eso son (62) \_\_\_\_\_. Respiran

por (63)\_\_\_\_\_. No son capaces de mantener la (64)\_\_\_\_\_ corporal constante, se dice que son animales (65)\_\_\_\_\_. Todos tienen fecundación (66)\_\_\_\_\_, después de ser fecundados la hembra pondrá los (67)\_\_\_\_\_, protegidos por una (68)\_\_\_\_\_ dura que evita la desecación, en un nido que abandonará más tarde, serán así animales (69)\_\_\_\_\_. En algunos casos, por ejemplo las serpientes, el huevo se queda dentro del cuerpo de la madre y de allí nacerán las crías desarrolladas, estos serán (70)\_\_\_\_\_.

Las (71)\_\_\_\_\_  
están adaptadas  
a (72)\_\_\_\_\_, por este motivo han conseguido unas adaptaciones peculiares: son organismos (73)\_\_\_\_\_, su cuerpo pesa relativamente poco, el único hueso compacto es el esternón o (74)\_\_\_\_\_ porque allí se insertan los (75)\_\_\_\_\_



responsables del (76)\_\_\_\_\_, sus extremidades anteriores se han transformado en (77)\_\_\_\_\_ y tienen todo el cuerpo cubierto por (78)\_\_\_\_\_. Se encuentran en todos los ambientes, de forma que podemos encontrarlas desde los polos hasta el ecuador, esto es porque pueden mantener la (79)\_\_\_\_\_ corporal (80)\_\_\_\_\_, se dice que son animales (81)\_\_\_\_\_. En la cabeza tienen dos (82)\_\_\_\_\_ con (83)\_\_\_\_\_, las fosas nasales, el oído para detectar (84)\_\_\_\_\_ y el (85)\_\_\_\_\_ que puede presentar diferentes tipos de adaptaciones según el tipo de alimentación: carnívoros, se alimentan de (86)\_\_\_\_\_, insectívoros, de (87)\_\_\_\_\_, granívoros, de (88)\_\_\_\_\_, omnívoros, de (89)\_\_\_\_\_, entre otros. El tubo digestivo tiene el (90)\_\_\_\_\_, donde se acumulan los alimentos ingeridos sobre todo en las crías, la (91)\_\_\_\_\_, donde se tritura gracias a pequeñas (92)\_\_\_\_\_ previamente ingeridas, el estómago, donde se (93)\_\_\_\_\_, el intestino, donde se (94)\_\_\_\_\_ los nutrientes ya digeridos y la (95)\_\_\_\_\_, cavidad donde también desembocan el aparato (96)\_\_\_\_\_, y el

(97)\_\_\_\_\_ Respiran por (98)\_\_\_\_\_ que tienen unas extensiones llamadas (99)\_\_\_\_\_ (100)\_\_\_\_\_ para aumentar la cantidad de aire y oxígeno que pueden respirar. En muchas especies hay (101)\_\_\_\_\_ antes de la cópula, los machos presentan colores (102)\_\_\_\_\_ mientras que las hembras tienen colores (103)\_\_\_\_\_ para pasar desapercibidas durante la incubación. La fecundación es (104)\_\_\_\_\_. El óvulo fecundado se rodea de una membrana y una (105)\_\_\_\_\_ dura protectora, todo formará el (106)\_\_\_\_\_. La hembra los pondrá en el (107)\_\_\_\_\_ donde estará días (108)\_\_\_\_\_. Después de la eclosión saldrán las (109)\_\_\_\_\_ que serán (110)\_\_\_\_\_ por sus padres.



Los (111)\_\_\_\_\_ se llaman así porque (112)\_\_\_\_\_ a sus crías. Tienen el cuerpo cubierto de (113)\_\_\_\_\_ que los protege y evita que pierdan (114)\_\_\_\_\_ ya qué son animales (115)\_\_\_\_\_ capaces de mantener su (116)\_\_\_\_\_ constante. En la cabeza presentan dos (117)\_\_\_\_\_ protegidos por (118)\_\_\_\_\_ dos orificios (119)\_\_\_\_\_ dos orejas y la boca provista de los (120)\_\_\_\_\_ una adaptación para (121)\_\_\_\_\_ la leche durante la lactancia, y los (122)\_\_\_\_\_ de los cuales hay cuatro tipos diferentes según su función. En el tronco presentan cuatro (123)\_\_\_\_\_ adaptadas al tipo de desplazamiento que tienen, por ejemplo los murciélagos tienen (124)\_\_\_\_\_ para (125)\_\_\_\_\_ y los delfines (126)\_\_\_\_\_ para (127)\_\_\_\_\_. La mayoría presenta una (128)\_\_\_\_\_ algunos la han perdido, para mantenerse durante las carreras rápidas como lo hace el (129)\_\_\_\_\_ o para sujetarse como los (130)\_\_\_\_\_. La respiración es (131)\_\_\_\_\_. La fecundación es (132)\_\_\_\_\_. El desarrollo embrionario puede ser de tres maneras: dentro de un (133)\_\_\_\_\_ como el (134)\_\_\_\_\_, este es (135)\_\_\_\_\_, dentro del interior de la madre pero las crías nacen poco desarrolladas acabando de hacerlo en una

(136)\_\_\_\_\_ donde se encuentran las (137)\_\_\_\_\_, son los llamados (138)\_\_\_\_\_ como por ejemplo el (139)\_\_\_\_\_ o dentro del interior de la madre pero desarrollándose completamente gracias a una estructura denominada (140)\_\_\_\_\_ que permite el intercambio de (141)\_\_\_\_\_ entre la madre y la cría. Estos son los (142)\_\_\_\_\_ como por ejemplo el (143)\_\_\_\_\_.