


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΟ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

1. Τρία τεμάχια Α, Β και C, μάζας 4 kg, 2 kg και 1 kg αντίστοιχα, έρχονται σε επαφή σε μια επιφάνεια αμελητέας τριβής όπως φαίνεται. Εάν εφαρμόζεται δύναμη 14 N στο σώμα των 4 kg, τότε η δύναμη επαφής μεταξύ Α και Β είναι..



α) 18 N

β) 2 N

γ) 6 N

δ) 8 N

2. Ένα μπαλόνι με μάζα «m» κατεβαίνει με μια επιτάχυνση «a» (<g). Πόση μάζα πρέπει να αφαιρεθεί από αυτό έτσι ώστε να αρχίζει να κινείται με επιτάχυνση «a» προς τα πάνω ;

α)

$$\frac{ma}{g+a}$$

β)

$$\frac{ma}{g-a}$$


γ)

$$\frac{2ma}{g+a}$$

δ)

$$\frac{2ma}{g-a}$$

3. Ποιο μέγεθος δύναμης F πρέπει να εφαρμοστεί προς τα κάτω για την ανύψωση του καλαθιού βάρους 2000 N χρησιμοποιώντας τη συσκευή 4-τροχαλιών που φαίνεται παρακάτω



α) 2000 N

γ) 500 N

β) 250 N

δ) 1000 N

4. Ένα πουλί ζυγίζει 2 κιλά και βρίσκεται μέσα σε κλειστό κλουβί 1 κιλού. Εάν αρχίσει να πετά, τότε ποιο είναι το βάρος του συγκροτήματος πουλιού και κλουβιού..

α) 1,5 κιλά

β) 3 κιλά

γ) 2,5 κιλά


δ) 4 κιλά

5. Εξετάστε το σύστημα που φαίνεται στο σχήμα. Ο τοίχος είναι λείος, αλλά η επιφάνεια μεταξύ των σωμάτων Α και Β είναι τραχιά. Η τριβή στο Β λόγω Α στην ισορροπία είναι

α) προς τα πάνω


β) προς τα κάτω

F →



γ) μηδέν

δ) το σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει σε ισορροπία

6.	Μια δύναμη 10N δρα μόνη της σε σώμα (μάζα 1kg) για 5 δευτερόλεπτα. Μια δεύτερη δύναμη 20N ενεργεί τότε σε αντίθετη κατεύθυνση. Το σώμα θα α) σταματήσει σε 5 δευτερόλεπτα β) σταματήσει σε 10 δευτερόλεπτα γ) δεν θα σταματήσει δ) θα σταματήσει και μετά θα κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση
7.	Ένα σώμα μάζας M τραβιέται κατά μήκος μιας οριζόντιας επιφάνειας χωρίς τριβή από ένα σχοινί μάζας m. Η δύναμη F συνδέεται στο ένα άκρο του σχοινιού. Ποια είναι η δύναμη, την οποία ασκεί το σχοινί στο σώμα ;  α) $F / (M-m)$ β) $F / M(m + M)$ γ) $FM / (M+m)$ δ) $FM / (M-m)$
8.	Ένα αντικείμενο με μάζα 10kg κινείται με σταθερή ταχύτητα 10 m / s. Στη συνέχεια, μια σταθερή δύναμη δρα για 4 δευτερόλεπτα στο αντικείμενο και του δίνει ταχύτητα 2m / s σε αντίθετη κατεύθυνση. Η επιτάχυνση που παράγεται είναι α) $3 \text{ m} / \text{s}^2$ β) $-3 \text{ m} / \text{s}^2$ γ) $0,3 \text{ m} / \text{s}^2$ δ) $-0,3 \text{ m} / \text{s}^2$
9.	Ένα αντικείμενο με μάζα 10kg κινείται με σταθερή ταχύτητα 10 m / s. Στη συνέχεια, μια σταθερή δύναμη δρα για 4 δευτερόλεπτα στο αντικείμενο και του δίνει ταχύτητα 2m / s σε αντίθετη κατεύθυνση. Η δύναμη που δρα στο αντικείμενο είναι α) 30 N β) -30 N γ) 3 N δ) -3 N
10.	Μια δύναμη 5 N δρα σε ένα σώμα βάρους 9,8 N. Ποια είναι η επιτάχυνση που παράγεται σε m / sec^2 α) 49.00 β) 1.46 γ) 5.00 δ) 0,51