3. Latvijā mīt 13 abinieku sugas – 5 varžu, 6 krupju un 2 tritonu sugas.
Izlasi aprakstus par Latvijas abiniekiem un nosaki, kurš abinieks katrā no tiem raksturots!

A. Šo abinieku tēviņiem riesta laikā uz muguras izveidojas gara sekste. Viņi Latvijā ir sastopami retāk nekā otra radniecīgā suga.
B. Šie bezastainie abinieki dzīvo galvenokārt uz sauszemes. Meklējot patvērumu, viņi mēdz ierakties dziļi augsnē, tāpēc dzīvo vietās, kur ir smilšaina augsne.
C. Šie brūnganie bezastainie abinieki bieži vien ir sastopami pļavās un dārzos. Viņus var pazīt pēc tumšajām "brillēm" ap acīm.
D. Šos zaļos abiniekus ir grūti atšķirt no citām radniecīgām sugām, jo viņi nav pastāvīga suga, bet rodas divu citu sugu krustošanās rezultātā.
E. Šīs sugas vardes ir ļoti līdzīgas parastajai vardei. Visvieglāk var atšķirt šīs sugas tēviņus, kuri riesta laikā maina krāsu.
G. Šis bezastainais abinieks bieži vien ir sastopams cilvēka mājokļu tuvumā. Viņa brūngani pelēcīgo ādu klāj nelieli indes dziedzeri.
H. Šie abinieki Latvijā ir sastopami tikai dažās vietās. Viņi ir vienīgie abinieki Latvijā, kuri var kāpelēt pa kokiem.

Parastā varde
Lielais tritons
Smilšu krupis
Purva varde
Parastais krupis
Eiropas kokuvarde
Zaļā varde

LIVEWORKSHEETS