

ใบความรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น

ตัวอย่างที่ 1 โยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็น

1.1 ที่ลูกเต๋าทิ้งแต้มเป็นจำนวนที่ 3 หารลงตัว

1.2 ที่ลูกเต๋าทิ้งแต้มมากกว่า 2

วิธีทำ โยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง จะได้แซมเปิลสเปซ ดังนี้

$$S = \boxed{}$$

$$\therefore n(S) = \boxed{}$$

1.1 ให้ E_1 แทน เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทิ้งแต้มเป็นจำนวนที่ 3 หารลงตัว

$$\therefore E_1 = \boxed{} \quad n(E_1) = \boxed{}$$

จาก $P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$

แทนค่า $P(E_1) = \frac{n(E_1)}{n(S)}$

$$= \boxed{} = \boxed{}$$

1.2 ให้ E_2 แทน เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทิ้งแต้มมากกว่า 2

$$\therefore E_2 = \boxed{}, \quad n(E_2) = \boxed{}$$

$$\therefore P(E_2) = \frac{n(E_2)}{n(S)}$$

$$= \boxed{} = \boxed{}$$

2

{ 3, 6 }

4

6

{ 3, 4, 5, 6 }

$\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}$

$\frac{4}{6}$

$\frac{2}{6}$

{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }