

Андрійко купив у шкільному буфеті 3 цукерки по 2 грн і 4 булочки. Яка ціна однієї булочки, якщо вартість всієї покупки 42 грн?

	Ціна (грн)	Кількість (шт.)	Вартість (грн)
I	2 грн	3 шт.	?
II	?	4 шт.	?

42 грн



1) $\cdot$ = (грн) – вартість цукерок.

2) $-$ = (грн) – вартість булочок.

3) $:$ = (грн)

Відповідь: грн ціна однієї булочки.

2) Андрійко купив у шкільному буфеті 3 цукерки по 2 грн і 4 булочки. Яка ціна 1 булочки, якщо хлопчик заплатив за всі булочки на 30 грн більше, ніж за всі цукерки?

	Ціна (грн)	Кількість (шт.)	Вартість (грн)
I	2 грн	3 шт.	?
II	?	4 шт.	?, на 30 грн б.



1) $\cdot$ = (грн) – вартість цукерок.

2) $+$ = (грн) – вартість булочок.

3) $:$ = (грн)

Відповідь: грн ціна однієї булочки.

3) Андрійко купив у шкільному буфеті 3 цукерки по 2 грн і 4 булочки. Яка ціна 1 булочки, якщо їх вартість у 6 разів більша, ніж вартість всіх цукерок?

	Ціна (грн)	Кількість (шт.)	Вартість (грн)
I	2 грн	3 шт.	?
II	?	4 шт.	? у 6 р.б.



1) $\cdot$ = (грн) – вартість цукерок.

2) $\cdot$ = (грн) – вартість булочок.

3) $:$ = (грн)

Відповідь: грн ціна однієї булочки.