

TÍNH CHẤT

⇒ CHO CHẤT PHÂN TỬ LƯỢNG CAO TỪ MLK → BM
⇒ Giới hạn sự PT BM

⇒ ngân BM vs MLK
 PAS: ngân bạc
 KHUẤY: mông, liên tục, dính vào B&H BM
 KHUẤT: ~~trên~~ 3 LỚP LÁ

LÀ SÁNG ← 40-50nm; i_{tr}
SẮT TB BM


ÁP ĐÁY (40-50nm; nhiều e)
LÀ ĐÁO (số lỗ trống ở miền H 3-4nm)
(7 đến 10 H₂NH).

- Gd'n MLK = 40 n 20

- Lá đậy: coll IV; lamina, heparinsulfat

- xđ neo: coll VII

LÀ SỢI VÒNG: Gắn chặt Lã Đai



LỚP ĐỀM { gồm: MLK - mạt CH } → T kết dính; TX
 { B: dầu mè + gạo } MLK và BM

Guồn Lá: BM; cđ; mđ; TB Schwann
ĐC ĐÁY

LÁ
SƠ VŨNG: TB MLK.

SẮT NHẠU $\left\{ \begin{array}{l} \text{KHUỖNG: } 0 \text{ THẤY GIỚI BÀO} \\ \text{KHUỖT: GIỚI BÀO } 15 - 20 \mu\text{m} \end{array} \right.$

dạng
 NHÂN TƯƠNG THÍCH TỶ
 CẦU → □, diện.
 THOI Dẹt → Dẹt
 TRỨNG → Trứng

Sự phân cực ⇕ chức năng

- cực nóng: trên nhĩ
- cực lạnh: dưới nhĩ
- các loại TB ở phân cực

NƯỚC DƯỠNG PHÂN BỐ

- có mạch máu bạch huyết
- sống = dd khuếch tán từ MLC qua màng đáy

Tân cùng TBTK.

n° 10 TK TRẦN
 (ở vò Bọc);
 chia nhánh
 chạy (7 Gian Bào)

пер хис — BM

BM ĐỒ BIẾT
HOẠT THẦN
TB CẨM GIỚI