


HOẠI TỬ

CÁC BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI

NHÂN



BẢO TỒN: 3 bước

- B1: mất bất màu ← mất RNA ribosom kiểm
 B2: tăng bất màu acid ← mất các gốc carboxyl protein biến chất
 B3: xoá mờ các cấu trúc ← mất UNB, mất C-POKE RATION SUP

Màng

mất tính thấm chọn lọc → trương, vỡ

HOẠI TỬ MỖ

HOẠI TỬ ĐÔNG

- Đặc trưng cho: hoại tử do thiếu oxy
 xảy ra ở: HỒN HẾT CẤP HUY
 ví dụ: NÃO (tắc mạch)

NHÂN

mất hoàn toàn cấu trúc
 vẫn còn hình dạng do protein đông lại → ngưng cốt s hoá

mỡ → khối
 - nhỏ, đặc
 - ưa eosin
 - vữa của các TB kế lân.

chỉ tồn tại [LƯU]
 xem chuyển sang
 HOẠI TỬ LÔNG

HOẠI TỬ LÔNG

- Đặc trưng cho: HTKTW
 TB chết rất nhanh
 → e sữa kíp → mô lỏng rã
 thiếu oxy cục bộ
 chấn thương


thể
 viêm trung
 [phụ viêm cấp] HTL

bach cầu
 bạch cầu
 tiểu TB
 mẩn huyết
 mô tan biến

Ố ÁP XE

do VK sinh mủ
 hoại: vẩn xơ mờ
 trong: chất HTL
 bạch cầu đa nhân
 mẩn huyết TB

Gặp ở:
 - chấn thương
 - viêm tụy cấp



HOẠI TỬ BÃ ĐÀU

Đặc trưng cho: LAO (1 dạng viêm hạt mạn tính)

TB: chết; e còn đường viêm
 → các mảnh vụn bất màu EOSIN

HOẠI THỦ

Đặc trưng: THỐI RỬA DO VK KỊ KHÍ

màu đen do lắng đọng ION SULPHIDE
 hậu quả của phản giải HB