

Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

ВІЛ/СНІД

Одним із можливих наслідків ризикованої статевої поведінки є інфекції, що передаються статевим шляхом. Ці хвороби найбільш поширені серед активної молоді й призводять до небезпечних ускладнень.

Загальні ознаки ІПСШ позначте правильні відповіді

Підвищення температури тіла	<input type="checkbox"/>
Збільшення лімфовузлів	<input type="checkbox"/>
Зубний біль	<input type="checkbox"/>
Свербіння статевих органів	<input type="checkbox"/>
Нежить	<input type="checkbox"/>
Неприємний запах виділень	<input type="checkbox"/>



Як можна інфікуватись ВІЛ?

Статевим шляхом	<input type="checkbox"/>
Через комарів та інших комах	<input type="checkbox"/>
Від матері до дитини (<input type="checkbox"/>
Через рукоштовання, спілкування, дружні поцілунок, чхання тощо	<input type="checkbox"/>
Через кров	<input type="checkbox"/>
Через спільне користування душем, басейном, туалетом, ванною тощо	<input type="checkbox"/>

Вставте пропущені слова

..... – це вірус, що потрапляє в організм, руйнуючи імунну систему. В результаті цього можуть розвиватися різноманітні інфекції, хвороби та пухлини

..... – це захворювання, яке виникає внаслідок інфікування ВІЛ, кінцева, четверта стадія ВІЛ-інфекції.

..... — уявлення, що існує в суспільстві, згідно з яким певні якості людей або їхня поведінка є ганебними й аморальними. Про СНІД склалося уявлення, що це хвороба тих, хто вживає ін'єкційні наркотики, працівників секс-бізнесу і гомосексуалів. Тому коли дізнаються, що хтось є ВІЛ-позитивним, до нього можуть ставитися з підозрою.

