

اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي :

غاز (A2) $V = 3.5$ برعاء (C3) غاز (O2) $V = 1000 \text{ mL}$ برعاء (2)	وعاءان يحويان غازين مختلفين عند نفس الضغط والحرارة فإن عدد الجزيئات ...					
متساويا الوعاءين A,B	(د)	في الوعاء B ضعف الوعاء A	(ج)	أكبر في الوعاء B	(ب)	(أ) أكبر في الوعاء A
٢ ماحجم وعاء يحوي 2.5 mol من الهيدروجين في الظروف المعيارية ؟						
90 L	(د)	67.2 L	(ج)	56 L	(ب)	(أ) 44.8 L
٣ حاصل ضرب الضغط في الحجم مقسوما على كمية معينة من الغاز عند درجة حرارة ثابتة يساوي مقدار ثابت ..						
القانون العام للغازات	(د)	قانون الغاز المثالي	(ج)	قانون شارل	(ب)	(أ) قانون بويل
٤ العامل غير المؤثر على الضغط الجزيئي للغاز هو						
حجم الوعاء	(د)	عدد المولات	(ج)	درجة حرارة خليط الغاز	(ب)	(أ) نوع الغاز
٥ كيف نجعل غاز حقيقي يسلك سلوك غاز مثالي :						
زيادة الضغط خفض درجة الحرارة	(د)	نقصان الضغط ارتفاع درجة الحرارة	(ج)	نقصان الضغط خفض درجة الحرارة	(ب)	(أ) زيادة الضغط ارتفاع درجة الحرارة
٦ عدد مولات غاز في 11.2L في الظروف المعيارية :						
2 mol	(د)	1 mol	(ج)	0.5 mol	(ب)	(أ) 0.25 mol
٧ الحجم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من الجسيمات عند نفس درجة الحرارة والضغط هذا نص مبدأ ..						
أفوجادرو	(د)	جاي لوساك	(ج)	شارل	(ب)	(أ) دالتون
٨ يرمز لثابت الغاز المثالي بالرمز R ويساوي						
0.0082L.atm /mol.k	(د)	0.82 L.atm /mol.k	(ج)	0.082mol.k/Latm	(ب)	(أ) 0.082 L.atm/mol.k
٩ مأكتلة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجرامات الموجودة في بالون حجمه 1.0 L في الظروف المعيارية ؟						
19.8 g	(د)	1.98 g	(ج)	44 g	(ب)	(أ) 0.045 g
١٠ حجم 0.5 mol من غاز النيتروجين عند درجة حرارة 273k ، وضغط 1 atm يساوي						
67.2 L		44.8 L		22.4 L		11.2 L
١١ عدد مولات في عينة من غاز حجمها 3.72 L في الظروف المعيارية تساوي						
3.166 mol	(د)	2.166 mol	(ج)	1.166 mol	(ب)	(أ) 0.166 mol
١٢ احسبي حجم غاز الاكسجين عند STP اللازم ليتفاعل مع 52 g من الحديد تماما (Fe= 55.8)						
20.8 L	(د)	15.6 L	(ج)	10.6 L	(ب)	(أ) 0.624 L

١٣	أي الخواص التالية لا تنطبق على الغازات المثالية					
	(أ) الجسيمات حجمها معدوم	(ب) الجسيمات تشغل حيزاً	(ج) الجسيمات لا يوجد بينها قوى تجاذب	(د) الطاقة الحركية للنظام لا تتغير		
١٤	أي من الغازات التالية لا تسلك سلوك الغاز المثالي					
	(أ) Ar	(ب) H ₂ O	(ج) CH ₄	(د) C ₃ H ₆		
١٥	عند إطفاء الحرائق يحل ثاني أكسيد الكربون محل الأكسجين لأن					
	(أ) كثافة ثاني أكسيد الكربون أقل من الأكسجين	(ب) كثافة ثاني أكسيد الكربون أكبر من الأكسجين	(ج) كثافة ثاني أكسيد الكربون تساوي الأكسجين	(د) عذرات ثاني أكسيد الكربون أكبر من الأكسجين		
١٦	احسبي حجم 0.323 mol من غاز ما عند درجة حرارة 256 K وضغط جوي مقداره 90 atm؟					
	(أ) 3.8 L	(ب) 4.8 L	(ج) 6.8 L	(د) 7.8 L		