

Fermentación dos _____ de animais herbívoros. Estes poden ser moitas veces restos vexetais, fundamentalmente a palla. Os tipos de esterco máis usados son os de ovella, vaca, cabra, cabalo, galiña e porco. Os estercos de _____ quedaron en desuso e introducíronse os de _____.

Os _____ son os líquidos que desprende o esterco, considerase como un tipo de esterco aínda que han de ser _____ para que o seu uso non afecte _____ as plantas.

Conséguese da _____ da materia _____. O compost está formado por unha **mestura de restos vexetais, ás veces animais _____ e _____.**

A turba son restos _____ que co paso do tempo, se van carbonificando en auga de pantanos, marismas e humedais.

O guano é o _____ das _____ e dos _____.

O humus de miñoca é o _____ das miñocas que viven no chan, prodúcese en instalacións industriais e recolleemos estes excrementos, para que se usen como unha enmenda orgánica. Coñecese tamén como _____.

Das algas obtéñense _____ que poden ser beneficiosos para as plantas e aportan gran cantidade de materia orgánica. Adoitan presentarse de **forma _____.**

Proceden da depuración de _____ e úsanse como enmenda orgánica por ter gran **cantidade de _____ e elementos beneficiosos.** Son **restos de _____ procedentes das plantas _____ deste tipo de auga.**