



EVALUACIÓN FINAL

NOMBRE: _____
No. CARNÉ: _____ FECHA: _____

I SERIE

Instrucciones: a continuación, se presentan varias interrogantes que deberá responder de forma clara y concreta, se le solicita hacerlo sin faltas ortográficas.

1. Estudia y explica las conductas inusuales y trata de predecir las conductas extrañas que una persona puede llegar a mostrar.
2. Trastorno en el que el paciente presenta una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal o de casi cualquier otro signo que aparezca en el cuerpo.
3. Nombre de la actividad donde el paciente realiza movimientos superfluos o gestos desproporcionados que se trasladan a los actos habituales.
4. Nombre que recibe el grado máximo de disgregación en el pensamiento.
5. Es el nombre del síntoma neurológico con lentitud del pensamiento.

II SERIE

Instrucciones: lea con atención los siguientes enunciados y marque cheque la opción que considere es la respuesta correcta "V" si es verdadero o "F" si es falso.

		V	F
1.	En el trastorno de síntomas somáticos comúnmente existe un blanco corporal específico del defecto, comprometiendo en orden descendente a piel, cabello, nariz, abdomen, dientes, peso, torso, nalgas, ojos, muslos, cejas, forma del rostro, piernas, barbilla, labios, brazos, caderas, mejillas y orejas		
2.	El trastorno depresivo persistente afecta el estado de ánimo que a menudo se parece a una forma de depresión mayor menos severa, pero más crónica. Puede afectar o alterar radicalmente la alimentación, el sueño y la manera de pensar.		
3.	El trastorno bipolar se identifica por la presencia de uno o más estados de personalidad (cada uno con sus patrones de percepción relativamente estables, con relación a, y pensando en el entorno y el yo.		
4.	El trastorno de estrés postraumático se presenta después de algún suceso aterrador por sus circunstancias físicas o emocionales.		
5.	El trastorno facticio es considerara una enfermedad mental en la que una persona inventa una enfermedad o lesión.		

III SERIE

Instrucciones: completa los siguientes enunciados con las palabras que se encuentran en las casillas de abajo. Debe tomar la que considere correcta y escribirla donde corresponde.

Parafilias	Efebofilia	Ansiedad	Amnesia Disociativa	Paidofilia
------------	------------	----------	---------------------	------------

1. El trastorno de _____ está relacionado con el impacto del miedo, ira o incluso felicidad que una persona pueda estar experimentando.
2. Las _____ se caracterizan por una activación sexual ante objetos o situaciones que no forman parte de las pautas habituales de los demás.
3. La fuga disociativa tiene todas las características de una _____, a la que se añade un desplazamiento intencionado lejos del hogar o del lugar de trabajo, durante el cual se mantiene el cuidado de sí mismo.
4. La _____ se caracteriza por la atracción (heterosexual u homosexual) de una persona adulta (hombre o mujer, heterosexual u homosexual) hacia una persona adolescente del mismo o distinto género.
5. La _____ se caracteriza por la atracción (heterosexual u homosexual) de una persona adulta o adolescente (hombre o mujer, heterosexual u homosexual) hacia un niño o niña del mismo o distinto género.

IV SERIE

Instrucciones: lea con atención las siguientes preguntas y seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes trastornos se caracteriza por la presencia de alucinaciones auditivas?
 - a. Trastorno de ansiedad generalizada
 - b. Trastorno bipolar
 - c. Esquizofrenia
 - d. Trastorno obsesivo-compulsivo
2. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma común de la depresión mayor?
 - a. Euforia
 - b. Insomnio o hipersomnia
 - c. Aumento de la libido
 - d. Hiperactividad
3. ¿Qué tipo de terapia es más comúnmente utilizada para tratar los trastornos de ansiedad?
 - a. Terapia psicoanalítica
 - b. Terapia cognitivo-conductual
 - c. Terapia humanista
 - d. Terapia de grupo
4. El trastorno bipolar se caracteriza por:
 - a. Cambios extremos en el estado de ánimo, incluyendo episodios de manía y depresión
 - b. Alteraciones del sueño y del apetito
 - c. Fobia a situaciones sociales
 - d. Comportamientos compulsivos
5. ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)?
 - a. Alucinaciones
 - b. Distracción y falta de atención
 - c. Comportamiento antisocial
 - d. Ciclos de manía y depresión

V SERIE

Instrucciones: a continuación, encontrará varios conceptos del lado izquierdo de la evaluación, que se relacionan con los significados del lado derecho. Deberá unir con una línea cada uno de ellos según considere sea la respuesta correcta.

PSICOPATOLOGÍA	Programa de intervención sistemática cuyo propósito es modificar el estado conductual, afectivo y cognitivo del paciente.
TERAPIA	Es importante en el psicodiagnóstico, establece elementos del paciente en el contacto con la realidad, alucinaciones y delirios.
PSICOLOGÍA CLÍNICA	Síndrome o patrón conductual o psicológico clínicamente significativo que ocurre en un individuo y está asociado con una angustia presente, con un deterioro de una o más áreas importantes del funcionamiento o con un riesgo significativamente elevado de sufrir muerte, dolor, incapacidad o una pérdida importante de la libertad.
SOMATIZACIONES	Se utiliza como un indicador de un rol resultante de anormalidad, es comparar el desempeño del individuo con los requerimientos de dicho rol.
ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESTRÉS	Instrumento que da criterios para identificar psicopatías.
FUNCIÓN DEL EXAMEN MENTAL	Término que los psicólogos clínicos utilizan como sinónimo de conducta anormal.
ANORMALIDAD SEGÚN DSM-IV-TR	Cuando una persona presenta uno o más síntomas físicos y tras un examen médico, estos síntomas no pueden ser explicados por una enfermedad médica.
DISFUNCIÓN	Provocan cambios en nuestro organismo y nos hacen más sensibles al dolor, e influyen en nuestras enfermedades.
ESCALA HARE	Es el trastorno que debilita el sistema inmunológico.
DEPRESIÓN	Es el campo profesional que se interesa en el estudio, la evaluación, el tratamiento y la prevención de la conducta anormal en individuos afectados.