2020-21

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಶಾಲಾ ಹಂತದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಅವಧಿ: 1 ಗಂಟೆ **ವಿಷಯ : ಗಣಿತ** **ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 40**

I. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 'n'ನೇ ಪದ $a_n = 3n + 3$ ಆದಾಗ ಶ್ರೇಡಿಯ 3ನೇ ಪದವು:

A. 9 B. 12 C. 6 D. 13

2. ಮೊದಲ ಪದ 'p' ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 'q' ಆಗಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ nನೇ ಪದ:

A. $p + (n + 1)q$ B. $p - (n + 1)q$ C. $p + (n - 1)q$ D. $p - (n - 1)q$

3. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಅಲ್ಲ:

A. 1 , 3 , 9 , 27 B. 1, $1\frac{1}{2}$, 2 , $2\frac{1}{2}$ C. 2 , 6 , 10 , 14 D. 1 , 4 , 7 , 10

4. 8, 13, 18..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪದವು:

A. 34 B. 32 C. 36 D. 38

5. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ST||QR ಆದರೆ $\frac{PS}{SQ}$ ಗೆ ಸಮನಾದದು:



A. $\frac{PS}{SQ}$ B. $\frac{PT}{TR}$ C. $\frac{PS}{TR}$ D. $\frac{PT}{SQ}$

6. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು 4:9 ಆದರೆ, ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು:

A. 81:16 B. 16:81 C. 9:4 D. 2:3

7. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\Delta ANB \sim \Delta AMC$, AM ಮತ್ತು AN ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಅನುಪಾತ 2 : 5 ಆದರೆ CM : BN ಅನುಪಾತವು:



A. 2:3 B. 2:5 C. 5:2 D. 3:2

8. ΔABC ಯಲ್ಲಿ, $\angle B = 90^\circ$, AC = 25ಸೆಂ.ಮೀ, BC = 24 ಸೆಂ.ಮೀ ಆದರೆ ABಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

A. 10 B. 7 C. 14 D. 6

LIVEWORKSHEETS

9. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಕ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳು,

A. ನಿಖರವಾಗಿ ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. B. ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

C. ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. D. ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

10. $2x+3y-9=0$ ಮತ್ತು $4x+6y-18=0$ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ರೇಖೆಗಳು:

A. ಛೇಧಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು B. ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳು C. ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು D. ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವ ರೇಖೆಗಳು

11. $x - y = 2$ ಮತ್ತು $x+y=4$ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳು:

A. 3, 1 B. 4, 3 C. 5, 1 D. -1, -3

12. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಾದ $x + 2y = 3$ ಮತ್ತು $2x + 4y = k$ ಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಂಡರೆ 'k'ಯ ಬೆಲೆಯು:

A. 3 B. -3 C. 6 D. -6

13. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು PQ ಗೆ ಸಮವಾದರೆ, $\angle POQ$ನ ಬೆಲೆ:

A. 90^o B. 30^o C. 60^o D. 45^o



14. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $\angle APB = 40^o$ ಆದರೆ, $\angle AOP$ ಯ ಬೆಲೆ:

A. 70^o B. 80^o C. 60^o D. 140^o



15. 'O' ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು 'Q' ನಿಂದ 13 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ QO = 12ಸೆಂ.ಮೀ ಆದರೆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ:

A. 25ಸೆಂ.ಮೀ B. 5ಸೆಂ.ಮೀ C) 1ಸೆಂ.ಮೀ D) 8ಸೆಂ.ಮೀ



16. P(4, 3) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು x- ಅಕ್ಷದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ:

A. 2 ಮಾನಗಳು B. 3 ಮಾನಗಳು C. 4 ಮಾನಗಳು D. 5 ಮಾನಗಳು

17. ಬಿಂದು (4,-3) ಮತ್ತು ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ:

A. 2 ಮಾನಗಳು B. 3 ಮಾನಗಳು C. 4 ಮಾನಗಳು D. 5 ಮಾನಗಳು

18. (3, 8) ಮತ್ತು (-7, 4) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು:

A. (-5, 6) B. (2, 6) C. (5, 6) D. (6, 5)

LIVEWORKSHEETS

19. A(2, –2) ಮತ್ತು B(–1, x) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು 5 ಮಾನಗಳಾದಾಗ, 'x' ನ ಬೆಲೆ:

A) x = –3 ಅಥವಾ x = 4 B) x = 3 ಅಥವಾ x = –4

C) x = 2 ಅಥವಾ x = –6 D) x = –2 ಅಥವಾ x = 6

20. A(–4, 0), B(4, 0) ಮತ್ತು C(0, 3) ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧ:

A. ಸಮದ್ವಿಬಾಹು B. ಸಮಬಾಹು C. ಅಸಮಬಾಹು D. ಲಂಬಕೋನ

21. $ax^2 + bx + c = 0$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ c ನ ಬೆಲೆ:

A. $\frac{-b}{2a}$ B. $\frac{b}{2a}$ C. $\frac{b^2}{4a}$ D. $\frac{-b^2}{4a}$

22. $3x^2 + 7x + 4 = 0$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವು:

A. ಊಹಾ ಮೂಲಗಳು B. ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ C. ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ D. ಸಮ

23. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವು:

A. ax^2-bx+c=0 B. ax^2+bx+c=0 C. ax^2-bx-c=0 D. ax^2+bx-c=0

24. (x + 3) (3x - 2) = 0 ಈ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು:

A) x = 6 ಅಥವಾ x = 2 B) x = 3 ಅಥವಾ $x = -\frac{2}{3}$

C) x = –6 ಅಥವಾ $x = \frac{2}{3}$ D) x = –3 ಅಥವಾ $x = \frac{2}{3}$

25. ಎರಡು ಕ್ರಮಗತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು 25 ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪವು:

A) $x^2 + (x + 1)^2 + 25 = 0$ B) $x^2 - (x + 1)^2 = 25$

C) $x^2 + (x + 1)^2 = 25$ D) $x^2 + (x - 1)^2 = 25$

26. Cos (90-θ) ಗೆ ಸಮನಾದದು:

A. Cosθ. B. Tanθ. C. Sinθ. D. Cotθ.

27. $\text{Sin } 60^0 \times \text{Sin } 30^0$ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಬೆಲೆಯು:

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

28. $\text{Cos } 48^0$ - $\text{Sin } 42^0$ ಯ ಬೆಲೆಯು:

A. 1 B. 0 C. 48^0 D. 42^0

29. $(1 - sin^2\theta)sec^2\theta$ ನ ಬೆಲೆಯು:

A. 1 B. 0 C. 45^0 D. 2

LIVEWORKSHEETS

30. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಬಿಂದುವಿನಿಂದ ದತ್ತ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು:

A. 1 B. 3 C. 2 D. ಅನಂತ

31. ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದ ಒಂದು ಏಣಿಯ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 60^0 ಮತ್ತು ಏಣಿಯ ಪಾದವು ಗೋಡೆಯಿಂದ 9.5 m ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏಣಿಯ ಉದ್ದವು:

A. 16 m B. 18 m C. 19 m D. 20 m

32. $100\sqrt{3}$ ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ತುದಿಯನ್ನು ಅದರ ಪಾದದಿಂದ 100 ಮೀ. ದೂರದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಉನ್ನತ ಕೋನ

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

33. ಸರಾಸರಿ=27, ಮಧ್ಯಾಂಕ=33, ಆದರೆ ಬಹುಲಕ

A. 30 B. 43 C. 45 D. 47

34. 5, 8, 14, 16, 19 ಮತ್ತು 20 ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಬಲೆ ಎಷ್ಟು:

A. 14 B. 19 C. 16 D. 8

35. ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೋಷ್ಟಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ್ಲೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ

A. ಸರಾಸರಿ B. ಬಹುಲಕ C. ಮಧ್ಯಾಂಕ D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ

36. ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನ ಒಂದುತುದಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದರೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ:

A. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕು B. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ

C. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳ D. ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು

37. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು 'r' ಮತ್ತು 'h' ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತವು:

A. 1: 3 B. 3: 1 C. 2: 3 D. 3: 2

38. ತ್ರಿಜ್ಯ 7cm ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು:

A. 154 cm^2 B. 308 cm^2 C. 616 cm^2 D. 770 cm^2

39. ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ:

A. $\frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$ B. $\frac{1}{3}\pi h(r_1^2 - r_2^2 - r_1 r_2)$

C. $\frac{1}{3}\pi h(r_1 + r_2 + r_1 r_2)$ D. $\frac{1}{3}\pi h(r_1 - r_2 - r_1 r_2)$

40. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 154 cm^2 ಆದರೆ ಇದರ ತ್ರಿಜ್ಯವು:

A. $\frac{7}{2}$ cm B. $\frac{7}{\sqrt{2}}$ cm C. $\frac{7}{\sqrt{3}}$ cm D. $\frac{7}{3}$ cm

LIVEWORKSHEETS