LKPD

KONSEP LOGARITMA

&

SIFAT-SIFAT LOGARITMA

- **TUJUAN PEMBELAJARAN**

MENERAPKAN KONSEP LOGARITMA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK PERMASALAHAN
- **DALAM SOAL**

MENYAJIKAN PENYELESAIAN MASALAH LOGARITMA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DALAM SOAL



UNTUK KELAS X
SEMESTER GASAL

LIVEWORKSHEETS

NAMA :

KONSEP LOGARITMA

Definisi Logaritma

Adalah Suatu bilangan dalam matematika yang merupakan kebalikan/Invers dari sebuah Bilangan Berpangkat

Bentuk Umum Logaritma

$$a^p = b \Leftrightarrow {}^a\log b = p$$

Dengan a = Bilangan Pokok/Basis
b = Numerus
p = Hasil dari Logaritma

note:

Khusus untuk Bilangan Pokok/basis = 10, maka tidak perlu ditulis

thank you!

LIVEWORKSHEETS

Perhatikan Video berikut:

Latihan Soal 1

Example : Ubahlah Bilangan berpangkat berikut menjadi bentuk logaritma:

a. $5^3 = 125 \Leftrightarrow {}^{5}\log 125 = 3$

b. $7^{-2} = \frac{1}{49} \Leftrightarrow {}^{7}\log \frac{1}{49} = \square$

c. $32^{\frac{1}{5}} = 2 \Leftrightarrow \square \log 2 = \frac{1}{5}$

d. $10^4 = 10000 \Leftrightarrow \log \square = 4$

LIVEWORKSHEETS

SIFAT-SIFAT LOGARITMA

Logaritma Satu

a. $6^1 = 6 \Leftrightarrow {}^6\log 6 = 1$

b. $5^1 = 5 \Leftrightarrow {}^5\log 5 = 1$

Simpulan : ${}^a\log a = \square$

Logaritma Nol

a. $12^0 = 1 \Leftrightarrow {}^{12}\log 1 = 0$

b. $2^0 = 1 \Leftrightarrow {}^2\log 1 = 0$

Simpulan : ${}^a\log 1 = \square$



Logaritma Pangkat Numerus

a. $5^3 = 125 \Leftrightarrow {}^5\log 125 = {}^5\log 5^3 = 3$

Dengan ${}^5\log 5^3 = 3 \cdot {}^5\log 5$

b. $10^2 = 100 \Leftrightarrow {}^{10}\log 100 = {}^{10}\log 10 \square$

Dengan ${}^{10}\log 10^2 = 2 \cdot {}^{10}\log 10$

c. ${}^2\log 81 = {}^2\log 3 \square = \square \cdot {}^2\log 3$

Simpulan : ${}^a\log b^p = \square \cdot {}^a\log b$

LIVEWORKSHEETS

Logaritma Pangkat Basis dan Numerus



a. $32^{\frac{3}{5}} = 8 \Leftrightarrow {}^{32}\log 8 = {}^{2^5}\log 2^3 = \frac{3}{5}$

Dengan ${}^{2^5}\log 2^3 = \frac{3}{5} \cdot {}^{2}\log 2$

b. ${}^{216}\log 25 = {}^{6^3}\log 5^2 = \frac{\square}{3} \cdot {}^{6}\log 5$

Simpulan : ${}^{a^r}\log b^p = \frac{\square}{\square} \cdot {}^{a}\log b$

Logaritma Penjumlahan

${}^{a}\log b + {}^{a}\log c = {}^{a}\log(b \cdot c)$

${}^{6}\log 4 + {}^{6}\log 9 + {}^{6}\log 6 = {}^{6}\log(4 \cdot 9 \cdot 6)$

$= {}^{6}\log \square$

$= {}^{6}\log 6^3 \quad \langle Sifat\ 3 \rangle$

$= 3 \cdot {}^{6}\log 6 \quad \langle Sifat\ 1 \rangle$

$= 3 \cdot \square$

$= \square$

$\log 4 + \log 25 + \log 10 = \log(4 \cdot 25 \cdot \square)$

$= \log \square$

$= \log 10^3 \quad \langle Sifat\ 3 \rangle$

$= \square \cdot \log 10 \quad \langle Sifat\ 1 \rangle$

$= \square \cdot 1$

$= 3$

LIVEWORKSHEETS

Logaritma Pengurangan

$^{7}\log 490 - {}^{7}\log 5 - {}^{7}\log 2 = {}^{7}\log\left(\frac{490}{5 \cdot 2}\right)$

$= {}^{7}\log 49$

$= {}^{7}\log 7^{\square} \quad \langle Sifat\ 3 \rangle$

$= \square \cdot {}^{7}\log 7 \quad \langle Sifat\ 1 \rangle$

$= 2 \cdot \square$

$= \square$

$^{3}\log 54 - {}^{3}\log 4 - {}^{3}\log \frac{1}{2} = {}^{3}\log\left(\frac{54}{4 \cdot \frac{1}{2}}\right)$

$= {}^{3}\log \square$

$= {}^{3}\log 3^{\square} \quad \langle Sifat\ 3 \rangle$

$= 3 \cdot {}^{3}\log 3 \quad \langle Sifat\ 1 \rangle$

$= 3 \cdot \square$

$= \square$

Logaritma Kebalikan

$$^{b}\log a = \frac{1}{{}^{a}\log b}$$

a. Jika $^{2}\log 3 = x$ Maka $^{3}\log 2 = \frac{1}{{}^{2}\log 3} = \frac{1}{x}$

b. Jika $^{3}\log 81 = 4$ Maka $^{81}\log 3 = \frac{1}{{}^{3}\log \square} = \frac{\square}{\square}$

LIVEWORKSHEETS

Logaritma dengan Pembentukan Basis Baru

$$^{a}\log b = \frac{^{p}\log b}{^{p}\log a}$$

Example : Ubahlah bentuk logaritma berikut dengan menambahkan basis baru:

a. Jika $^{2}\log 3 = x$ maka Nilai dari $^{48}\log 36$ adalah ...

Jawab : Untuk mengerjakan soal di atas, kita harus mengubah dulu logaritma $^{48}\log 36 = \frac{^{2}\log 36}{^{2}\log 48}$ atau $^{48}\log 36 = \frac{\square\log\square}{\square\log\square}$

(Dalam hal ini, kita memilih basis baru angka 2 da 3 karena yang diketahui di dalam soal adalah logaritma $^{2}\log 3 = x$)

Logaritma dipangkatkan dengan Logaritma

$$a^{\,^{a}\log b} = b$$

a. $5^{\,^{5}\log 100} = 100$

b. $8^{\,^{2}\log 3} = \left(2^{\square}\right)^{\,^{2}\log 6} = 2^{3\cdot{}^{2}\log 6} = 2^{\,^{2}\log 6^{3}} = 6^{\square} = \square$

LIVEWORKSHEETS

Logaritma Perkalian

$$^{a}\log b \cdot {}^{b}\log c \cdot {}^{c}\log d = {}^{a}\log d$$

a. $^{5}\log 7 \cdot {}^{7}\log 2 \cdot {}^{2}\log 5 = {}^{5}\log 5 =$ ☐

b. $^{7}\log 64 \cdot {}^{2}\log 81 \cdot {}^{3}\log \frac{1}{49}$

$= ({}^{7}\log 2^{\square})\,({}^{2}\log 3^{\square})({}^{3}\log 7^{\square})$

$= (\square \cdot {}^{7}\log 2)^{\square} \cdot {}^{2}\log 3^{\square} \cdot {}^{3}\log 7)$

$= \square \cdot \square \cdot \square\ ({}^{7}\log 2 \cdot {}^{2}\log 3 \cdot {}^{3}\log 7)$

$= \square \cdot ({}^{7}\log 7)$

$= \square$

c. $^{\frac{1}{36}}\log 27 \cdot {}^{25}\log 216 \cdot {}^{9}\log \sqrt{5}$

$= \left({}^{6^{-2}}\log 3^{3}\right) \cdot \left({}^{5^{2}}\log 6^{\square}\right) \cdot \left({}^{3^{2}}\log 5^{\frac{1}{2}}\right)$

$= \left(\frac{3}{-2} \cdot {}^{6}\log 3\right) \cdot \left(\frac{3}{\square} \cdot {}^{5}\log \square\right) \cdot \left(\frac{\frac{1}{2}}{2} \cdot {}^{3}\log \square\right)$ ⟨*Sifat 3*⟩

$= \frac{3}{-2} \cdot \frac{\square}{\square} \cdot \frac{1}{4} \cdot \left({}^{6}\log 3 \cdot {}^{5}\log 6 \cdot {}^{3}\log 5\right)$ ⟨*Ubah Posisi*⟩

$= -\frac{\square}{\square} \cdot \left({}^{6}\log 3 \cdot {}^{3}\log 5 \cdot {}^{5}\log 6\right)$ ⟨*Sifat 10*⟩

$= -\frac{9}{\square} \cdot \left({}^{6}\log 6\right)$ ⟨*Sifat 1*⟩

$= -\frac{9}{16} \cdot \square$

$= -\frac{\square}{\square}$

LIVEWORKSHEETS