


MỘT SỐ GIUN ĐỆP KHÁC



SÁN DÂY

- Ở LỢN: DÀI ĐẾN 3m
- Ở TRÂU BÒ: DÀI ĐẾN 8-9m
- GÂY BỆNH LỢN GẠO



Nếu người ăn thịt trâu bò có nang ấu trùng còn sống hay không nấu kỹ, nang ấu trùng sẽ được giải thoát trong ruột, đầu lộn ra ngoài, bám vào màng trong ruột non và trưởng thành trong 8 đến 10 tuần. Sau đó sán bắt đầu sản xuất đốt.

Người là ký chủ vĩnh viễn, bò là ký chủ trung gian, sán trưởng thành sống 25 năm, hầu hết bệnh nhân chỉ có một con sán ký sinh. Một số trường hợp rất hiếm ký sinh nhiều sán.

Triệu chứng lâm sàng

Một số người nhiễm sán không có triệu chứng. Nếu có, bệnh nhân than đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, yếu ớt. Một trường hợp hiếm có 7 con sán trong ruột gây tắc nghẽn ruột làm bệnh nhân từ vong, một số trường hợp bệnh nhân than phiền ngứa hậu môn, do đốt sán bò ra hậu môn. Một số ca nhiễm nặng, bệnh nhân thường sốt, chảy nước dãi, ăn mất ngon.