

استعمال ثوابت الاتزان

$$[\text{NO}] = \sqrt{(1.2 \times 10^{-4}) \times (0.166) \times (0.145)}$$

$$1.7 \times 10^{-3} \text{M}$$

$$[\text{NO}]^2 = K_{\text{eq}} \times [\text{N}_2][\text{O}_2]$$

$$K_{\text{eq}} = \frac{[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2][\text{O}_2]}$$

$$K_{\text{sp}} = [\text{Mg}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$$

$$K_{\text{sp}} = [\text{Ba}^{2+}]^3[\text{SO}_4^{2-}]$$

1. يُستعمل ثابت الاتزان لحساب تركيز مادة عند الاتزان، إذا علمنا تراكيز المواد المتفاعلة والنتيجة الأخرى.

ثابت حاصل الذوبانية هو ثابت اتزان ذوبان مركب أيوني قليل الذوبان في الماء.

3 - 4 استعمال ثوابت الاتزان

اقرأ، في كتابك، حول حساب التراكيز عند الاتزان.

أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ماذا يُمكنك استعمال ثابت الاتزان من القيام به؟

2. إذا كان ثابت الاتزان للتفاعل: $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}$ ، عند درجة حرارة 273 K يساوي $K_{\text{eq}} = 1.2 \times 10^{-4}$.
a. اكتب تعبير ثابت الاتزان للتفاعل.

b. اكتب المعادلة التي ستستخدمها لحساب تركيز NO.

c. ما تركيز NO إذا كان: $[\text{N}_2] = 0.166 \text{ M}$ ، و $[\text{O}_2] = 0.145 \text{ M}$ ؟

3. ما ثابت حاصل الذائبية؟

4. ما تعبير ثابت حاصل الذائبية للتفاعل: $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{PO}_4^{3-}_{(\text{aq})}$ ؟

5. ما تعبير ثابت حاصل الذائبية للتفاعل: $\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$ ؟