

登革熱



登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，此病毒經由蚊子傳播給人類。

消滅登革熱 先了解病媒蚊

登革熱主要是藉由病媒蚊叮咬人時將病毒傳入人體內，並不會人傳人



疾病管制署
預防登革熱專區



埃及斑蚊

喜歡棲息於室內的人工容器或是人為所造成積水的地方



白線斑蚊

比較喜歡棲息於室外

登革熱的症狀

罹患登革熱了嗎？
這些症狀要注意！



Heho



潛伏期 (3-8天)

可傳染期

急性期 (3-6天)

前驅期 (1-2天)

恢復期 (可延數周)

學齡前
常見症狀

咳嗽

嘔吐

肚子痛

不明
紅疹



成人
常見症狀

頭痛

咳嗽

關節痛

肚子痛

發燒

流鼻涕

不明
紅疹



f Heho健康

LIVEWORKSHEETS

登革熱

症狀不輕忽
就醫不延誤!!



免費
防疫專線
1922



發燒



肌肉
關節痛



頭痛



出疹



眼窩劇痛



自疫情流行地區返家後，須進行自主健康管理14天，
如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史。

發燒

肌肉關節痛

頭痛

出疹

眼窩劇痛



全民愛健康
蚊蟲篇18



登革熱的重症症狀



圖文創作：健談 havemary.com
專家諮詢：新光醫院家醫科
胡念之醫師

登革熱重症警示

登革熱重症症狀



健談 havemary.com



1 嗜睡

2 躁動不安

3 肝臟腫大



1 嚴重器官損傷

2 嚴重出血



登革熱相關問題，
建議諮詢「家醫科、感染科」

更多資訊請上 健談 havemary.com


登革熱防治 4 大招

巡



定期檢查家裡有沒有積水的情況出現

倒



發現積水的用具，馬上倒掉

清



清除掉不用的器具

刷



定期作器具的刷洗，防止蟲卵殘留

家裡內外有禍水！？ 防治病媒蚊 巡倒清刷叫牠走！


室內：



冰箱底盤、花瓶、水生植物容器、花盆底盤


每週刷洗並換水一次

室外：



貯水桶、水缸、
水泥槽

每週刷洗
並換水一次



廢輪胎、空罐
廢棄馬桶等
廢棄容器

清除積水後交由
清潔隊運走或
通知環保局處理

地下室：



積水



排除積水並且尋找漏水原因加以修補

如何預防登革熱

① 裝紗窗



② 噴防蚊液



③ 清除積水容器



④ 戶外穿長袖衣物



⑤ 使用捕蚊燈



⑥ 生病在家休息



請_レ你_レ找_出登_レ革_レ熱_レ的_レ預_防方_式戶

1



清_レ除_レ積_レ水_レ容_器戶

2



噴_レ防_レ蚊_レ液_戶

3



水_レ桶_レ裝_水戶

4



使_戶用_レ捕_レ蚊_レ燈_戶

5



地_下室_戶積_レ水_レ不_レ清_レ

6



室_戶內_レ裝_レ紗_戶窗_戶