




## 1. Αντιστοιχίστε τις εικόνες με τις έννοιες




Δελτοειδής μυς



Ελάσσων γλουτιαίος μυς



Μείζων γλουτιαίος μυς



Έξω πλατύς & ορθός μηριαίος μυς

## 2. Συμπληρώστε τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που βρίσκονται στο κουτί

5, γρηγορότερα, μειωμένη απορρόφηση, αδυναμία, πεπτικού σωλήνα, ελαιώδες, γαστρεντερικές, αξιολόγηση, 20-23, επιλογή, ελάσσονας γλουτιαίος

Οι ενδείξεις κατά την ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκων είναι:

\_\_\_\_\_ κατάποσης.

\_\_\_\_\_ σκεύασμα που δεν χορηγείται ενδοφλέβια.

Ανάγκη για παράκαμψη του \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ απορρόφηση γίνεται από το μυϊκό ιστό.

Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά είναι \_\_\_\_\_ ml.

\_\_\_\_\_ από άλλη οδό.

Σχεδιασμός ενδομυϊκής χορήγησης

Αρχικά πρέπει να γίνεται \_\_\_\_\_ της μυϊκής μάζας.

Γίνεται \_\_\_\_\_ σημείου χορήγησης σε περίπτωση θεραπείας.

Οι βελόνα πρέπει να έχει εύρος αυλού \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ G.

Ως πρώτη επιλογή ενδομυϊκής χορήγησης επιλέγεται ο \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ μυς.

### 3. Αντιστοιχίστε τις έννοιες

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Δελτοειδής μυς                  | Έως 5ml |
| Ελάσσων γλουτιαίος μυς          | 1-2ml   |
| Μείζων γλουτιαίος μυς           | 3-5ml   |
| Έξω πλατύς & ορθός μηριαίος μυς | Έως 4ml |

#### 4. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις σωστές ή λάθος

|  |                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Η ενδομυϊκή χορήγηση γίνεται σε γωνία 35 μοιρών                                                           |
|  | Μπορείτε να κάνετε ενδομυϊκή χορήγηση σε περιοχή με ουλές                                                 |
|  | Η βελόνα εισέρχεται στο σώμα κατά τα 2/3ενα από τα υλικά που χρειάζεστε για την τεχνική είναι το betadine |
|  | Η ενδομυϊκή χορήγηση αποφεύγεται σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή                                        |
|  | Αν παρατηρήσετε αίμα κατά την αναρρόφηση συνεχίζετε τη χορήγηση                                           |
|  | Πραγματοποιείτε δύο φορές υγιεινή των χεριών κατά τη διαδικασία                                           |
|  | Η ενδομυϊκή χορήγηση προτείνεται για κλινήρεις ασθενείς                                                   |