EJERCICIOS PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS.

INDICACIONES:

- ✓ Lea detenidamente lo que se le pide y resuelva por medio de proporcionalidad directa. (Regla de tres).
- ✓ Goteo de Suero por formula G = V/3T

1.- Se debe administrar a un paciente Ranitidina 25mg, la presentación de esta es de 50mg/2 ml, por lo que debe administrar una ampolla cada 12 horas,

2.- Un paciente que estuvo ejercitando durante la tarde, manifiesta dolor de cabeza, resequedad en la boca y malestar general, por lo que le indican se hidratación por vía endovenosa 1,000 ml a pasar en 8 horas, a cuantas gotas debe pasar.

3.- Una paciente manifiesta dolor de estómago y muchas náuseas posterior haber al haber ingerido atol de elote y comer una piña, por lo que le indican dimenhidrinato 60mg, la presentación de este es de 50mg /2 ml.

4.- Un litro de suero cuantas gotas contiene, siendo que 1L es igual a 1000ml y 1 cc es equivalente a 20gotas.

5.- Se debe administrar para un sangramiento intenso, Suero Hartman 1 litro 500 a chorro y el resto en 4 horas, cuantas gotas debe pasar.

6.- Un paciente quien sufrió una caída de su propia altura, manifiesta dolor muy fuerte en su pierna izquierda por lo que le indican Diclofenaco 100mg Intramuscular una dosis, su presentación es de 75mg/3ml, cuantas ampollas se debe administrar.

LIVEWORKSHEETS