




התאמה של בין ייצוג אלגברי לגרף בפונקציה קווית




- (1) לפניהם סרטוט של שני קווים ישרים: l_1 ו- l_2 ;
ונתונים שני ייצוגים אלגבריים: (1) ו- (2).
התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.
- $$y = 5x + 2 \quad (1)$$
- $$y = -5x + 2 \quad (2)$$




- (2) לפניהם סרטוט של שני קווים ישרים: l_1 ו- l_2 ;
ונתונים שני ייצוגים אלגבריים: (1) ו- (2).
התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.
- $$y = 4x + 5 \quad (1)$$
- $$y = 4x - 3 \quad (2)$$



- (3) לפניהם סרטוט של שלושה קווים ישרים: l_1 , l_2 ו- l_3 ;
ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו- (3).
התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.
- $$y = 3x + 2 \quad (1)$$
- $$y = 3x + 5 \quad (2)$$
- $$y = 3x - 3 \quad (3)$$



- (4) לפניהם סרטוט של שלושה קווים ישרים: l_1 , l_2 ו- l_3 ;
ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו- (3).
התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.
- $$y = x + 3 \quad (1)$$
- $$y = -x + 3 \quad (2)$$
- $$y = -x - 3 \quad (3)$$



- (5) לפניהם סרטוט של שני קווים ישרים: l_1 ו- l_2 ;
ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו- (3).
התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.
- $$y = 2x + 2 \quad (1)$$
- $$y = -2x + 6 \quad (2)$$
- $$y = 2x + 6 \quad (3)$$