

Заповнити пропуски виконавши завдання

Кроко немає функції приладу (розширення)

У середній частині ви бачите (Це означає, що ви можете (при подвійному кліку) термометра)

- Оберіть два судини з різними температурами.
- Визначте кількість подвійних кліків, потрібних, щоб отримати різницю температур на кількості подвійних кліків.

повноцінна рідинка 1 (пластикова 2)

міксер.



2

Поряд нами фізичний прилад – . Це прилад для вимірювання . Одиниця вимірювання температури – . Основна частина термометра – наповнена рідиною, і (пластинка з ділянками).

У оградінні шкали ви бачите . Це межа між градусами тепла і градусами морозу. Кінець стовпчика рідини в трубці термометра вказує на число градусів.

Щоб визначити ціну поділки шкали термометра, необхідно різницю будь-яких найближчих значень, поділених на шкалі, поділити на кількість між ними.

1. Оберемо два суходні значення температури, які наведені на шкалі, наприклад 16°C та 20°C . І знайдемо їх різницю: $20^{\circ}\text{C} - 16^{\circ}\text{C} =$

2. Визначимо кількість поділок між рисками, поряд з якими вказані ці значення, – поділок.

3. Отриману різницю поділимо на кількість поділок: $10^{\circ}\text{C} / 10 = 1^{\circ}\text{C}$. Отже, ціна поділки шкали становить . Наш термометр показує .

