

Gerak Lurus Berubah Beraturan

$$\textcircled{1} \quad V_t = V_0 \pm a.t$$

$$\textcircled{2} \quad s = V_0.t \pm \frac{1}{2}.a.t^2$$

$$\textcircled{3} \quad V_t^2 = V_0^2 \pm 2.a.s$$

Keterangan

V_t : Kecepatan Awal (m/s)

V_0 : Kecepatan Akhir (m/s)

t : Waktu (s)

a : Percepatan (m/s²)

s : Jarak (m)

Tujuan :

1. Memformulasikan persamaan gerak vertical dari persamaan GLBB
2. Menerapkan persamaan gerak vertical dalam kehidupan sehari-hari
3. Menganalisis Besaran Fisis yang terkait dengan peristiwa gerak vertikal

Kerjakan Aktivitas berikut dengan berurut dan tepat!

Aktivitas 1

a) *Jatuhkan* suatu benda atau objek misalnya bolpoint atau spidol ke lantai

b) Amati gerak benda, benda akan mengalami

c) Pada gerak lurus, perbedaan kedudukan suatu benda disebut dengan jarak (s) maka pada gerak vertical perbedaan kedudukan suatu benda di sebut dengan ...

d) Berdasarkan poin b, benda akan mengalami

Hal ini disebabkan karena adanya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada gerak vertical yang telah dilakukan, besaran

jarak (s) pada gerak lurus disebut dengan

pada gerak vertical, sedangkan besaran percepatan (a) pada gerak lurus disebut dengan pada gerak vertical.

- e) Apakah saat kalian melepaskan benda tersebut, gerak benda memiliki kecepatan awal???
-

Sehingga kita dapat memformulasikan gerak benda tersebut berdasarkan persamaan pada GLBB, yaitu:

Gerak Lurus

$V_t = V_o + a t$

Gerak Vertikal

$s = V_o t + \frac{1}{2} a t^2$

$V_t^2 = V_o^2 + 2 a s$

Maka dapat disimpulkan bahwa pada peristiwa tersebut termasuk ke dalam

Pendalaman Materi

Seorang anak menjatuhkan bola dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Jika waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk sampai ke tanah 2 s, maka hitunglah tinggi gedung tersebut! ($g = 10\text{m/s}^2$)