

Indica las células correspondientes a su definición

Son leucocitos que se caracterizan por presentar gránulos específicos en su citoplasma:

Células NK

Granulocitos

Monocitos

Son leucocitos menos numerosos. Se encuentra en la circulación sanguínea y sus gránulos contienen una variedad de sustancias y enzimas:

Neutrófilo

Eosinófilo

Basófilo

Contiene numerosos gránulos intracitoplasmáticos llenos de heparina, y algunos mediadores químicos de la inflamación como la histamina:

Mastocito

Megacariocitos

Monocitos

Son leucocitos de mayor tamaño presentes en la circulación sanguínea. Presenta un núcleo grande y arriñonado:

Células NK

Granulocitos

Monocitos

Son un tipo de leucocitos con una prolongación larga que le confiere un aspecto estrellado y se localiza en tejidos linfático o epitelio mucoso. Son las células presentadoras de antígenos más representativas:

Linfocitos T

Granulocitos

Células dendríticas

Son linfocitos grandes que intervienen en la defensa inespecífica del cuerpo. No necesitan ser activados por un antígeno extraño y son responsables antitumorales y de las células infectadas por virus:

Células NK

Granulocitos

Monocitos

Son glóbulos blancos de menor tamaño. Se encuentran en la médula ósea roja y en diversas estructuras linfoides. Son células que intervienen en la inmunidad adaptativa y reconocen a los antígenos extraños y actúan sobre ellos:

Linfocitos B y linfocitos T

Células NK

Macrófagos

Realiza diferentes funciones de gran importancia, tanto en la inmunidad innata como en la específica:

Mastocitos

Macrófagos

Megacariocitos